蘭陽地區水稻負泥蟲發生防治

83/04/25 花蓮區農情資訊 11

各位蘭陽地區農友請注意：最近在頭城（福城、拔雅里）、礁溪（林美、匏崙村）、員山（內城、湖西村）、三星（人和、天福村）、冬山（得安、八寶、安平村）、蘇澳（新城、聖湖里）及宜蘭市（梅州里）陸續發現水稻負泥蟲危害，請各位留意自己的水田是否亦有發現。負泥蟲喜歡停留在靠山且潮濕、陰冷地區的稻田。蟲卵產在葉片上，排列成一至二列，幼蟲與成蟲都會嚙食水稻葉肉，使葉片呈現灰白色之縱條，嚴重時全葉變白、枯死、水稻發育受阻，成熟期延長，影響稻穀產量與品質。其防治藥劑有下列數種：

藥劑名稱	每公頃每次用藥量	稀釋倍數（倍）	施藥時期及次數	注意事項
3%加保扶粉劑	40　60 公斤	—	水稻分蘖期中負泥蟲幼蟲發生時開始噴藥，若施藥後，田間密度尚高，隔 15 天再施藥一次。	限於插秧後 70 天內使用
50%益滅松可濕性粉劑	0.8　1.0 公斤	1,000		
40.64%加保扶水懸粉	1.0　1.2 公斤	800		
90%納乃得可濕性粉劑	0.5　0.6 公斤	1,800		
50%撲滅松乳劑	0.8　1.0 公升	1,000		
1%安丹粉劑	60　75 公斤	—		
1.5%益滅松粉劑	60 公斤	—		
3%益滅蝨粉劑	40 公斤	—		
50%益滅蝨可濕性粉劑	0.66 公斤	1,200		

註：詳細請參考植物保護手冊