

水稻白葉枯病為害請宜蘭地區農友加強防治

83/10/25 花蓮區農情資訊 23

宜蘭本（二）期水稻遭受提姆、凱特琳、道格、葛拉絲等颱風影響，白葉枯病病原細菌由颱風造成的傷口侵入水稻為害，全縣水稻均有白葉枯病病癥出現，被害普遍，須加強防治。

感染白葉枯病的水稻起初沿葉緣產生黃色條斑，條斑之周緣呈波浪狀，或葉緣呈蒼白黃色條紋。如發生在插秧不久之感病品種幼苗，會造成急性萎凋而枯死。防治白葉枯病之藥劑如下：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
10%克枯爛可濕性粉劑	1.0 公斤	1,000	發病初期開始施藥，以後每隔 10 天施藥 1 次，連續 3 次。	1.收割前 15 天停止用藥。 2.本藥劑可能發生藥害，宜單劑使用，不得混合 6.5%鐵甲砷酸銨溶液、25%寶克隆可濕性粉劑、75%三寶唑可濕性粉劑或 22.5%陶斯松乳劑等 4 種之任一農藥，或同時混合 25%寶克隆可濕性粉劑及 75%毆殺松乳劑二種農藥。
10%鏈四環黴素可溶性粉劑	1.0 公斤	1,000	發病初期開始施藥，以後每隔 10 天施藥 1 次共 3 次。	
6%撲殺熱粒劑	30 公斤		幼穗形成期前施藥一次	施藥時稻田內應保持水深 3 5 公分，維持 4 5 天