農友信箱

陳哲民

(一)國蘭葉片有褐色凸起物，是何原因？如何防治？（馮植林；花蓮縣吉安鄉干城 128-8 號）

答：經鑑定係褐圓介殼蟲蟲為害，目前尚無推荐藥劑。建議採用 44%大滅松乳劑 1,000 倍液防治。若受害株數少可用清水，人手洗去介殼蟲。

(二)青蔥葉片表皮有橘紅色粉狀物，是何原因？如何防治？（黃欽當；花蓮縣吉安鄉太昌路 415 號）

答：經診斷係青蔥銹病。可使用 23%三泰隆乳劑 2,000 倍液，每 7 天噴一次，連續四次，並酌加展著劑 CS-7，2000 倍。

(三)香蕉假莖有乳狀受害，不知何原因？如何防治？（玉山神學院；花蓮縣壽豐鄉）

答：經診斷係香蕉假莖象鼻蟲為害，可利用 3%加保扶粒劑，每株施用 30 公克於葉鞘部。

(四)大蒜葉片腐爛，是何病害？如何防治？（曾振都；花蓮縣吉安鄉廣賢路 33 號）

答：經鑑定係疫病菌為害，可採用 25%依得利乳劑 1500 倍液防治，收穫前 14 天停止用藥。

(五)榕樹葉片縮捲、掉落、枝幹乾枯，是何原因？如何防治？（宜昌國中；花蓮縣吉安鄉）

答：經現場鑑定係受星天牛及薊馬類為害。建議參考防治方法：　星天牛：2-4 月間，靠近地面 1 公尺高之樹幹應塗布石灰乳，以防雌成蟲產卵。　薊馬類：採用低毒性 2.8%賽洛寧可濕性粉劑 2,000 倍液防治。

(六)文旦葉片黃化、落葉、梢枯是何原因？如何防治？（高慶和；花蓮縣光復鄉西富村富田一街 23 號）

答：現場採樣鑑定結果，係立枯病。建議　剷除嚴重病株　加強防除媒介昆蟲木蝨，可噴施 50%陶滅蝨混合可濕性粉劑 1,000 倍液。

(七)聖誕紅葉、枝條異狀是何症狀？如何防治？（魏德明；花蓮縣吉安鄉慶豐村慶豐 4 街 1 號）

答：經檢視係蚜蟲及薊馬為害。蚜蟲可噴施 50%毆殺松可濕性粉劑 1,500 倍液防除。薊馬可噴施 2.8%第滅寧乳劑 2,000 倍液防除。

(八)香瓜露菌病及白粉病應如何防治？（邱佳田；花蓮縣壽豐鄉中正一村 12 鄰 7 號）

答：香瓜露菌病未發生時可噴施 80%福賽得可濕性粉劑 500 倍液、每 10 天一次加以預防。發生後則噴施 78%鋅錳波爾多可濕性粉劑 500 倍液防治。白粉病可噴施 21.2%依滅列乳劑 2,000 倍液防治，採收前 3 天應停止用藥。