

蔬菜種子藥劑消毒

83/05/25 花蓮區農情資訊 13

十字花科黑斑病因種子帶菌而導致播種後發芽不整齊或成株嚴重被害，而增加防治成本，利用種子拌藥消毒可以避免種子帶菌，而減少本田成株用藥。本場植物保護研究室陳任芳小姐，根據本場及各試驗機關初步試驗成果，提供產銷班班員栽培時消毒蔬菜種子之參考，藥劑如下：

十字花科	50%貝芬同（愛果丹、益果丹）可濕性粉劑
蔬菜	50%依普同（樂富果）可濕性粉劑
白芥藍	50%免賴得（億力）可濕性粉劑
	58%鋅錳滅達樂（利露滅）可濕性粉劑
	50%撲滅寧（速滅靈、速益寧、速滅寧）可濕性粉劑
	5%三泰芬（拜綠通）可濕性粉劑
黑芥藍	50%免賴得（億力）可濕性粉劑
	50%依普同（樂富果）可濕性粉劑
	50%撲滅寧（速滅靈、速益寧、速滅寧）可濕性粉劑
青江白菜	50%撲克拉錳(包祝讚)可濕性粉劑
白菜	50%撲克拉錳（包祝讚）可濕性粉劑
	58%鋅錳滅達樂（利露滅）可濕性粉劑
	5%三泰芬（拜綠通）可濕性粉劑
空心菜	50%免賴得(億力)可濕性粉劑
	50%依普同（樂富果）可濕性粉劑
紅莧菜	58%鋅錳滅達樂（利露滅）可濕性粉劑
	50%撲克拉錳(包祝讚)可濕性粉劑
白莧菜	58%鋅錳滅達樂（利露滅）可濕性粉劑
	50%免賴得(億力)可濕性粉劑
萵苣	50%免賴得（億力）可濕性粉劑
	50%撲克拉錳（包祝讚）可濕性粉劑
芹菜	50%依普同（樂富果）可濕性粉劑
	50%免賴得（億力）可濕性粉劑
	50%撲克拉錳（包祝讚）可濕性粉劑
胡瓜	58%鋅錳滅達樂（利露滅）可濕性粉劑

	033.5%快得寧（億級棒）水懸劑 0.335cc/公斤種子
--	--------------------------------

* 以上請任選一項藥劑參考使用，用藥量每公斤種子使用 3 公克藥拌種。