

為農民解答的專欄信箱

高安全

一、新種木瓜苗，根部腐爛枯死，是何原因？如何防治？（花蓮縣鳳林鎮林榮里高清泉）

答：經現場勘查結果，係木瓜苗根腐病，防治方法如下：

(一)實施輪作，罹病苗拔除後，不可種植於同穴。

(二)39%四氯丹水懸粉劑 800 倍，或 70%普拔克溶液 400 倍，每隔七天噴施一次，連續 2 ~ 3 次，遇雨季時酌予縮短施藥時間。

二、請問韭菜，葉片有白色食痕，是什麼害蟲？如何防治？（花蓮縣吉安鄉干城村林老順）

答：經現場勘查結果，係韭菜潛蠅為害。指導採用 50%益滅松可濕性粉劑 1,000 倍，加展著劑防治。採收前七天停止用藥。

三、請問柑桔病害及防治方法？（花蓮縣壽豐鄉米棧村黃俊輝）

答：經檢視係柑桔潰瘍病，指導採用 81.3%嘉賜銅混合可濕性粉劑 1,000 倍，或 56%氧化亞銅可濕性粉劑 600 倍，每隔 15 ~ 21 天施藥一次，連續 4 ~ 5 次。尤其大風雨侵襲後，應立即施藥。

四、詢問柑桔根部死亡原因及其防治方法？（花蓮縣壽豐鄉米棧村溫宏治）

答：經檢視係柑桔寄生性線蟲，春芽萌成時樹冠外圍下環形經覆上再灌水，保持適當溫度。開溝 15 公分深，任選下列一藥劑，撒布於溝底。(1).10%芬滅松粒劑，每公頃施用 30 公斤，每株施用 75 公克。(2).50%丁基加保扶粒劑，每公頃 80 公斤，每株施用 200 公克。(3).10%托福松粒劑，每公頃 20 公斤，每株 5 公克。

五、柑桔介殼蟲及其防治方法？（花蓮縣鳳林鎮山興里劉國華）

答：往現場勘查結果，係柑桔介殼蟲。介殼蟲初發生時，尚未固著較易防治，應把握此時，任選下列一種藥劑防治：(1).15%馬拉松乳劑 800 倍。(2).44%大滅松劑 1,000 倍。(3).33%福木松乳劑 500 倍。

六、柑桔黑點病，及其防治方法？（花蓮縣鳳林鎮山興里王賑）

答：經現場勘查結果，係柑桔黑點病，清除及燒燬枯枝後任選下列一種藥劑來防治。(1).56%貝芬硫混可濕性粉劑 800 倍。(2).70%晴硫混可濕性粉劑 1,000 倍。採收前 30 天停止用藥。

七、柑桔芽蟲及其防治方法？（花蓮縣鳳林鎮山興里王賑）

答：經現場勘查結果，係柑桔芽蟲為害，防治方法：(1).44%滅松乳劑 1,000 倍，可以同時防治其他害蟲。(2).50%福賜米松乳劑 1,000 倍。(3).25%滅賜松乳劑 1,000 倍可同時防治潛葉蛾及椿象類害蟲。