

## 「提姆」無情過境後的復耕建議

83/07/25 花蓮區農情資訊 17

今年的第一個強烈颱風 - 提姆經於本（七）月十日從本區秀姑巒溪出海口登陸，由於暴風半徑大、威力強，造成宜蘭、花蓮及台東三縣境內農業的慘重損失。各種受害農作物極待復耕，早日恢復生產。

針對災後復耕，建議如下：

葉菜類 - 1.颱風季節，平時做好防風設施及疏浚排水溝，以利菜園排水。2.採行較抗風的設施栽培或水平棚架網式栽培。3.災後容易發生病害，可參考植物保護手冊選擇推薦農藥防治。4.流失、埋沒菜園及時復耕，重新播種。5.颱風來臨前先用砂網覆蓋。

水芋 - 1.颱風過後清園並補施肥料，每 0.1 公頃施用尿素 20 公斤（硫酸銨 44 公斤）、氯化鉀 4 公斤，以促進發育。2.地勢較低的地方，在災後迅速排水並噴灑 58% 鋅錳滅達樂 500 倍，使植株較快恢復生長。

玉米 - 1.已屆成熟之玉米應儘速收穫，以減少損失。2.颱風過後排除畦溝內的積水，防止因田土過濕，影響玉米初期生長，並行噴藥一次，使用 65% 鋅乃浦可濕性粉劑 400 倍，以預防葉斑病及煤紋病發生。3.颱風過後扶正斜倒的玉米株，生育盛期的玉米則施用少量追肥，促進恢復生長。4.颱風過後淺耕一次，促進根系發育。5.颱風季節做好排水溝，以利排水。

文旦柚（柑桔） - 幼齡樹立支柱、固定樹幹、預防倒伏。颱風災後倒伏之果樹儘速扶起，立即進行清園工作、撿拾落果以防腐爛果產生臭味滋生蚊蠅。斷裂折損之枝條適當修剪，樹勢穩定後酌量施肥，全園噴撒防治病害農藥，如 80% 鋅錳乃浦可濕性粉劑 500 倍或 50% 免賴得可濕性粉劑 3,000 倍，4-4 式波爾多液 600 倍，65% 鎳乃浦可濕性粉劑 400 倍... 等，以免黑星病、流膠病、潰瘍病等感染擴大。

木瓜 - 立支柱固定樹幹預防折損倒伏。颱風災後傾斜之植株儘速以支柱支撐，勿使果實接觸地面，果實上側鋪以覆蓋物，防止日燒。