# 農友信箱

**陳哲民**

一、文旦柚心葉厚化，生長不良，是何原因？如何防治？（詹瓊花：花蓮縣瑞穗鄉瑞美村中山路 179 號）

答：經診斷係銹蜱取食芽部所致。防治方法可利用 25%丁基加保扶可濕性粉劑 1,000 倍液，每 21 天噴施一次，採收前 12 天停止施藥。或施用 42%克芬瑞水懸劑，每 35 天一次，採收前 30 天停止用藥。

二、玉米播種後如何施用殺草劑？（鍾發樹：花蓮縣瑞穗鄉富源村中正路 57 號）

答：玉米播種覆土後，任選下列一種藥劑均勻噴施於土壤表面。50%撲多草乳劑 250 倍，47.4%莫多草淨水懸劑 250 倍，50%撲奪草可濕性粉劑 200 倍，77.3%拔敵草乳劑 200 倍。

三、麻竹葉片蚜蟲及盲椿象棲息為害，應如何防治？（玉里榮民醫院：志學職能治療區）

答：麻竹葉扁蚜具明顯背光性，多群集葉背取食。防治時將 50%達馬松溶液或 25%滅賜松乳劑稀釋 4 倍，均勻塗刷於胸高竹節處，每二個月施用一次即可收效。採筍期前 18 天停止用藥。盲椿象可噴施 20%芬化利乳劑 2,000 倍液加以防治。

四、番茄莖葉水浸狀褐變是何病害？如何防治？（朱盛枝：花蓮縣新城鄉康樂村大有街 3 號）

答：經診斷係番茄晚疫病為害狀。可選用 80%免得爛可濕性粉劑 500 倍液，或 33%鋅錳乃浦水懸劑 600 倍液每隔 7 天噴施一次。

五、木瓜葉片斑點，是何原因？（姜志遠：花蓮縣吉安鄉干城村 191-5 號）

答：經診斷係噴施白粉病藥劑引起的藥害所造成的斑點。木瓜葉片對乳劑敏感，容易引起藥害，爾後應施用其他劑型農藥。

六、冬瓜整株枯死是何原因？應如何防治？（黃仿生：花蓮縣瑞穗鄉中山路二段 386 巷 10 號）

答：經鑑定係蔓枯病為害，目前尚無推薦藥劑。建議參考西瓜蔓枯病防治法。發病初期開始施用 21.2%依滅列乳劑 2,000 倍液，加展著劑出來通 CS-73,000 倍，每隔 7　10 天施藥一次。

七、月桔枝幹萎凋，葉上有蟲體是何原因？如何用藥？（公賣局花蓮分局：花蓮市仁愛街 35 號）

答：月桔萎凋係根部腐敗，可灌注 25%依得利乳劑 1,500 倍液及 50%免賴得可濕性粉劑 1,500 倍劑於根頭部。另須加強排水，受害株拔除後，將根圈土取走，填以新土再補植。葉上蟲體係褐圓介殼蟲，可噴施 44%大滅松乳劑 1,000 倍液加以防除。

八、苦瓜葉片表面有白色粉狀斑點，是何原因？如何防治？（陳河成：花蓮縣吉安鄉太昌村 12 鄰太昌路 549 號）

答：經診斷係白粉病病徵。建議參考選用下列一種藥劑噴施。21.2%依滅列乳劑 2000 倍液，11.76%芬瑞莫乳劑 10,000 倍液。每隔 10 天施用 1 次。