

蔓枯病來勢凶凶，瓜農注意預防

88/06/10 花蓮區農情資訊 134

宜蘭縣壯圍鄉近來瓜果遭蔓枯病危害，致瓜果無法採收，果農損失慘重，請農友注意防治，蔓枯病為一般瓜果較易感染的疾病，病狀是從根基部開始，外表發生褐化，出現水晶狀並產生紋路及龜裂影響瓜藤養分輸送，導致整株逐漸乾枯而死。

瓜果是宜蘭縣壯圍鄉重要的農作物，而部分洋香瓜及美濃瓜園皆傳出受蔓枯病危害而有果葉乾枯褐化，無法收穫之情形，為避免災情擴大，血本無歸，請果農們選用下列任一方法防治：

- 40%護矽得乳劑，於病發初期開始以每公頃 0.11 公升稀釋 1,000 倍施用，每隔 7-10 天施藥一次，連續 4 次，採收前 6 天停止施藥。
- 24.9%待克利乳劑，於病發初期以每公頃 0.35 公升稀釋 3,000 倍施用，每隔 7-10 天施藥一次，連續 4-5 次，採收前 6 天停止施藥。
- 60%得滅寧可濕性粉劑，病發初期每公頃以 0.5 公升稀釋 2,000 倍施用，每隔 7-10 天施藥一次，連續 4 次，採收前 15 天停止施藥。