

氣候轉暖陰曇多濕 水稻及番茄嚴防作物病蟲害

89/04/25 花蓮區農情月刊 145

近期氣候轉暖且陰曇多濕，水稻負泥蟲、葉稻熱病及番茄晚疫病易發病且發生為害，以下將提供防治方法供農友參考：

■水稻負泥蟲：負泥蟲之幼蟲與成蟲會嚙食水稻葉肉，使葉片呈現灰白色之縱條，影響稻穀產量及品質。當負泥成蟲、幼蟲為害率超過 3%時即應施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施用量	稀釋倍數
3%加保扶粉劑	40-60 公斤	-
50%益滅松可濕性粉劑	0.8-1.0 公斤	1,000
40.6%加保扶水懸粉	1.0-1.2 公斤	800
90%納乃得可濕性粉劑	0.5-0.6 公斤	1,800
50%撲滅松乳劑	0.8-1.0 公升	1,000
1%安丹粉劑	60-75 公斤	-
1.5%益滅松粉劑	60 公斤	-
3%益滅蝨粉劑	40 公斤	-
50%益滅蝨可濕性粉劑	0.66 公斤	1,200

■水稻葉稻熱病：施用粒劑時稻田應保持 3-5 公分水位，維持 4-5 天；稻葉發現淡綠色病斑時應即選擇治療藥劑噴施一次，若經七天繼續蔓延時再施藥一次；常年發生嚴重地區應在發病前施用預防藥劑。

藥劑名稱	每公頃每次施用量	稀釋倍數
6%撲殺熱粒劑	30 公斤	插秧後約 30 天施用
8%克氯綜粒劑	30 公斤	初發生時施藥
17%丙基喜樂松粒劑	60 公斤	插秧後 30-40 天施用
50%熱必斯可濕性粉劑	1.0 公斤	1,200
75%三寶唑可濕性粉劑	0.33 公斤	3,000
2%保米黴素溶液	0.1 公斤	1,000

■番茄晚疫病：各鄉鎮栽培田區，均應即時適藥防治。下列藥劑請選擇一種噴施，每 5-7 天一次，並遵守安全採收期。

藥劑名稱	每公頃每次施用量	稀釋倍數
83%氫氧化銅可濕性粉劑	2.5-3.0 公斤	400
50%達滅芬可濕性粉劑	2.5-3.0 公斤	400
64%鋅錳毆殺斯可濕性粉劑	2.5 公斤	500

23%亞托敏水懸劑	2.0 公升	1,000
58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑	2.5-3.0 公斤	400
70%甲基鋅乃浦可濕性粉劑	2.0-2.5 公斤	500