

新興台農甜蜜桃 現在種植好時機

88/11/25 花蓮區農情月刊 140

台農甜蜜桃是宜蘭及花蓮地區新興的一種經濟果樹，適合於平地地勢較高、排水良好之田區栽培，元月中、下旬開花，元月下旬至二月上旬結果，五月間採收，汁多柔軟且具有水蜜桃的特殊風味，是目前宜蘭地區致力發展的少量多樣化鮮食園產品之一。以下簡介甜蜜桃的栽培管理要點供農民參考。

■苗木繁殖方法

甜蜜桃苗木繁殖可用切接法，嫁接時期在宜蘭地區為每年冬至的前後一星期。將砧木苦桃距地面約 10-15 公分處剪去，選一光滑側用切接刀從斷面帶木質部向下縱切約 2 公分長；接穗亦選平滑一側，用切接刀自芽下方約 2 公分處略帶木質部縱削切下，並斜切其反面；將削好的接穗插入砧木切口中，使兩者密接，有一側與形成層密合，然後利用塑膠帶將接合處縛緊，並套上塑膠袋，以防止水分蒸散。外圍再以報紙包覆，可防因日光直接照射接穗而枯死，待萌芽 5 公分左右時，可將塑膠袋剪開。

■種植適期、行株距

11 月中旬至翌年元月上旬為種植適期，行距為 6 公尺，株距 5.5 公尺。

■栽培設施

採葡萄水平棚架式設施栽培為宜，較易遭受颱風侵襲為害之地區應搭設棚架。

■樹型建立

前 1~2 年著重於樹型建立，距基部 30-50 公分處留 3~5 個主枝，主枝呈 45 度角伸長，主枝上之新芽應全部去除以促使主枝迅速發育。翌年 8~9 月可陸續留亞主枝及側枝，每一主枝留 4~6 個亞主枝，並儘量均勻分布，亞主枝上的生長側枝最後會形成甜蜜桃主要結果枝。

第 3 年正式留果，應加強疏花、疏蕾及修剪，甜蜜桃 4 年生可結果 100~400 粒，果粒不能留太多，以免粒小降低商品價值。

■施肥法

請參考農林廳編印之施肥手冊。鼓勵果農自製有機堆肥，以改善土壤理化性質，其材料為稻殼 50%，米糠 15%，豆餅 15%，過磷酸鈣 10%，氯化鉀 10%，加水混合均勻堆積覆蓋 15 天再翻堆，經 3 個月充分發酵後，於冬季當基肥施用。

每株 3~5 年生施用 40~60 公斤，生育期再視果實發育情況酌施 43 號複合肥料。生理落果後，以有機濃縮液態肥料(含高磷鉀肥及微量元素如鎂、鈣等)300~400 倍液，每隔 10 天灌注樹冠下四周土壤，以供應根群吸收。

■套袋

採收前 3 週進行套袋作業，太早套袋，易發生落果情形。套袋前應注重東方果實蠅及其他病蟲害的防治工作，套袋質材需具有防水腊，薄層透明白色，不宜用厚紙不透明之套袋。

■病蟲害防治

應特別注意流膠病的問題，病原菌易從芽眼及傷口入侵，春天雨水多，建議噴 6 6 式波爾多液於樹幹及枝幹 5 6 次，若病菌已侵入主幹，可用刀切除患部及周圍健全部位，再以有機砷劑塗布樹幹防治。

栽培田區排水一定要良好，重視整枝修剪，日照充分均勻，秋、冬季應特別重視介殼蟲類的防治工作，春梢伸長時對蚜蟲、浮塵子、螟蟲等要徹底防治。病害方面如穿孔病、黑斑病及腐果病均宜注意預防及噴藥。

為提昇甜蜜桃之品質，建議加強修剪，疏蕾、疏果等管理工作，以提高單果重量，達到每台斤約 4 5 個單果之高品質水準。