

玫瑰葉蟬防治法

83/06/10 花蓮區農情資訊 14

每年尤其到了夏天，玫瑰葉蟬的問題總令花農困擾不已。其中，玫瑰二點葉蟬及神澤葉蟬的防治因有抗藥性的問題，已使花農在防治上束手無策。花農為達防治效果只有不斷增加施藥次數，或增加藥量。為減少農藥的使用，台中農業改良場針對中部地區花卉害蟬（二點葉蟬及神澤葉蟬）篩選有效藥劑。以下便是篩選結果，提供本區花農參考使用。惟抗藥性因地而異，因此其防治效果亦因而有差異，為防止抗藥性迅速發生，建議花農每次選用一種藥劑，並輪流施用。

二點葉蟬		神澤葉蟬	
50%覆滅蟬可濕性粉劑	1,000 倍	25%蟬離丹可濕性粉劑	500 倍
25%蟬離丹可濕性粉劑	500 倍	2.8%畢芬寧乳劑	2,000 倍
25%亞環錫可濕性粉劑	1,500 倍	25%新殺蟬乳劑	500 倍
38.5%得氯蟬水懸粉	1,500 倍	57%歐蟬多乳劑	2,000 倍
57%歐蟬多乳劑	2,000 倍	20%西脫蟬乳劑	1,500 倍
2.8%畢芬寧乳劑	2,000 倍	80%硫磺水分散性	500 倍
25%合賽多可濕性粉劑	4,000 倍	50%芬佈賜可濕性粉劑	2,000 倍
42%大克蟬粉劑	800 倍	正光展著劑	1,000 倍
50%歐滅松乳劑	1,500 倍	沙拉脫	1,000 倍
50%百蟬克可濕性粉劑	1,000 倍		
奶粉 1,000 倍混合酒精 50 倍			