

天候不定糧食作物病蟲害易發生農民請注意

88/10/25 花蓮區農情月刊 139

近期天候因受到丹恩颱風外圍環流的影響，雨量多且濕度大，糧食作物在此種氣候狀態之下易導致病蟲害的發生，以下將提供幾項病蟲害的防治方法及防治注意事項，請農友們參考。

■水稻紋枯病

- 1.發生地區及防治適期：各鄉鎮水稻，出現病斑時應即施藥。
- 2.防治方法：下列藥劑任選一種施用。

藥劑名稱	每公頃施用劑量	稀釋倍數
24.9%待克利乳劑	0.33 公升	3,000 倍
25%賓克隆可濕性粉劑	0.5 公斤	2,000 倍
40%滅普寧水懸劑	0.8-1 公升	1,200 倍
20%福多寧水懸劑	0.5 公升	2,000 倍
16.5%滅紋乳劑	0.5 公升	2,500 倍
6.5%鐵甲磷酸銨溶液	0.5 公升	2,000 倍
3%維利黴素溶液	1.0-1.2 公升	1,000 倍

- 3.防治注意事項：病徵出現時即行施藥，藥劑應噴於發生部位（葉鞘基部），經十四天後再噴施一次，藥劑噴射全株。此外，有機磷劑應依推薦藥劑量、濃度噴施。孕穗後期、抽穗開花期停止施用，改用抗生素類藥劑以防藥害。

■白葉枯病

- 1.防治地區及防治適期：各鄉鎮水稻區，應適時施藥防治。
- 2.防治方法：

避免偏施氮肥；晨露或雨水未乾前，勿進入稻田，減少人為傳染病菌。

任選下列一種藥劑施用：施用時間為每 10 天一次，需連續使用三次。

藥劑名稱	每公頃施用劑量	稀釋倍數
10%克枯爛可濕性粉劑	1.2 公斤	1,000 倍
10%鏈四環素可濕性粉劑	1 公斤	2,000 倍

- 3.注意事項：10%克枯爛可濕性粉劑宜單劑使用，以免發生藥害。

■田菁豆螟（豆莢螟、豆野螟蛾）

- 1.發生地區及防治適期：各鄉鎮田菁栽培區，應適時施藥防治。
- 2.為害特徵：幼蟲將葉片合在其內嚙食葉肉留外表皮膜或蛀入嫩莖髓內影響發育、折斷，被害蛀口常以蟲糞堆蓋。
- 3.防治方法（參考）：初發生時任選下列一種藥劑施用。

藥劑名稱	每公頃施用劑量	稀釋倍數
50%撲滅松乳劑	1.5-2.0 公升	1,000 倍
90%納乃得可濕性粉劑	0.7-2.0 公升	2,000 倍
22.5%陶斯松乳劑	1.5 公斤	700 倍