

農友信箱

陳哲民

一、大豆葉片黃化，葉背有白色粉末紅點，是何原因？如何防治？（陳永富；花蓮縣鳳林鎮二村 40 號）

答：經往現場診斷，係神澤氏葉蟎為害。尚無正式推薦藥劑。建議試用 42% 大克蹒乳劑 900 倍液防治之。因已屆充實期，施用 1 2 次即可。

二、文旦樹近地面樹幹基部流膠，如何診療？（蔡天財；花蓮縣萬榮鄉紅葉村 3 鄰 48 號）

答：經診療係柑桔褐腐病為害。建議切除患部及周圍健全部份後以 80% 益穗可濕性粉劑一份及生石灰 20 份，加水調成糊狀，塗抹切除部，俟癒合後，塗上柏油。

三、文旦株幹基部排出木屑及蟲糞，如何防治？（王文光；花蓮縣萬榮鄉紅葉村 2 鄰 34 號）

答：經診斷係星天牛為害。防治方法(1)在成蟲出現前，在樹幹離地面一公尺處塗布石灰乳或包紮塑膠布以防成蟲產卵。(2)於 4 5 月間成蟲出現時，每隔一個月施用 40.64% 加保扶水懸粉劑 100 倍液，於樹幹離地面 45 公分處，至八月為止。

四、柑桔銹蟎及椿象類如何防治？（林重仁；花蓮縣玉里鎮中山路二段 32 號）

答：柑桔銹蟎可於發生初期選用下列一種藥劑，防治之。

(1)25% 丁基加保扶可濕性粉劑 1,000 倍液每 3 星期施用一次。

(2)50% 芬佈賜水懸粉 2,000 倍液，每七天用一次，共二次。

(3)24% 毆殺滅溶液 750 倍液，每三星期一次。

(4)42% 克芬蹒水懸劑 3,000 倍液，每 35 45 天噴一次。

椿象類可用 44% 大滅松乳劑 1,000 倍液，或 85% 加保利可濕性粉劑 850 倍液，每隔 10 天施藥一次，共二次。

五、水稻稻株枯心，是何原因？如何防治？（曾阿抱；花蓮縣吉安鄉宜昌村南山二街 53 號）

答：經鑑定係一點螟蟲為害。建議選用 50% 撲滅松乳劑 1,000 倍液或 50% 芬殺松乳劑 1,000 倍液，施用 1 2 次。

六、甘藷蔓有瘡痂狀病斑，心芽萎縮，是何原因？如何防治？（古興福；花蓮縣富里鄉東里村新莊 4 號）

答：經診斷係甘藷縮芽病。建議以後種植抗病品種，如台南 45 號、台南 14 號、台農新 31 號。多施鉀肥，每公頃 200 公斤。目前尚無正式推薦藥劑。參考採用 80% 鋅錳乃浦可濕性粉劑 600 倍液防治之。

七、玉米心部捲曲以及心葉蟲食痕缺刻，是何原因？如何防治？（黃利吉；花蓮縣吉安鄉福興 38 - 1 號）

答：玉米心部捲曲係土壤中殘留殺草劑引起。至於心葉蟲孔係夜蛾類及玉米螟幼蟲為害，可利用 45% 一品松乳劑 1,000 倍液或 50% 陶斯松乳劑 1,000 倍液防治之。

八、文旦果蠅如何防治？（林金安；花蓮縣壽豐鄉池南村一段 28 號）

答：文旦果蠅可利用 95% 含毒甲基丁香油混合溶液，置於誘蟲燈內，懸掛於果園外蔭蔽樹枝下，離地面約 1.5 公尺，每個誘蟲燈距離 30 公尺，周年懸掛。