

作物病蟲害疫情防治 斜紋夜盜蟲、蝦殼天蛾、小黃薊馬

88/11/25 花蓮區農情月刊 140

■芋斜紋夜盜蟲、蝦殼天蛾

1.發生地區及防治適期

吉安鄉各村水芋田區應即時施藥防治（鄰近作物特須注意），以防猖獗蔓延為害。其他鄉鎮亦應注意。

2.防治方法

參考任選下列藥劑之一種，於傍晚時施藥防除，田埂、雜草、蒿桿堆積處，溝壁亦應同時施藥。

藥劑名稱	每公頃施用劑量	稀釋倍數	安全採收天數
40.8%陶斯松乳劑	1.0-1.2 公升	1,000 倍	15 天
2.8%畢芬寧乳劑	0.5-1.0 公升	2,000 倍	9 天
2.8%賽洛寧乳劑	0.5-1.0 公升	2,000 倍	9 天
75%硫敵克可濕粉劑	0.3-0.5 公斤	3,000 倍	6 天

上列藥劑之施用務須注意安全採收期。

幼蟲體出現時開始施藥，每隔 5-7 天再施藥一次。

芋田及鄰近旱作物園區，懸掛誘蟲盆，每公頃二個，以性費洛蒙緩釋劑誘殺雄成蟲（斜紋夜盜蟲部分）減少交尾機會，並適時清理盒內蟲體。

3.發布依據

世代幼蟲出現為害，本蟲係屬雜食性，蔓延迅速，應適時防治。

■小黃薊馬

小黃薊馬緊急防治用藥劑，已由行政院農業委員會同意以 20%亞滅培可溶性粉劑及 9.6%益胺溶液作為防治藥劑，請農民參考使用並進行防治工作。