

為農民解答問題的專欄信箱

陳哲民、劉昭雄

一、木瓜葉片背面有褐色木栓化情形，是何原因？如何防治？（許連賜 花蓮縣吉安鄉東昌村）

答：經診斷係紅蜘蛛取食為害，所造成的傷口。建議採用 25%滿離丹可濕性粉劑 1000 1,500 倍液，或 50%百滿克可濕性粉劑 2,000 倍液，或 19.5%白粉克可濕性粉劑 1,500 倍液防治。每隔 10 15 天噴藥一次，連續 2 3 次。藥劑宜輪流使用，藉以避免抗藥性之發生。高溫期施藥宜酌予降低濃度，並利用早晚田間溫度較低時施藥。

二、生薑植株黃化枯死，原因及防治為何？（吳俊亞 花蓮縣壽豐鄉水璉村芎寮 42 號）

答：經鑑定係生薑軟腐病。建議將受害植株拔除燒毀，以減少病原。未受害之薑株，若符合經濟效益，可採用 25%依得利乳劑 1,500 倍液灌注，並加強排水管理。

三、芋頭葉片上大型褐色病斑之原因及防治法？（全水生 花蓮縣吉安鄉干城村 119 號）

答：經鑑定為芋頭疫病。可施用 39%四氯丹水懸粉 500 倍液防治，每 7 10 天噴藥一次，共 2 3 次。

四、芋頭葉片枯死原因及防治法？（李傳木 花蓮縣吉安鄉南華村 350 號）

答：經診斷為紅蜘蛛為害，施用 50%歐滅松溶液 1,500 倍液或 50%百滿克可濕性粉劑 2,000 倍液防治，每 10 15 天噴一次，共二次，噴施時應將藥劑噴於背面。

五、番瓜果實及葉片水浸狀，組織壞死原因？（劉興泉 壽豐鄉農會 陳百安 花蓮市福建街 10 號）

答：經診斷係雨水或露水殘留果實上表或葉片邊緣，清晨陽光強烈照射，引起燙傷，尚無適當之預防方法。

六、洋香瓜露菌病防治法？（陳百安 花蓮市福建街 10 號）

答：洋香瓜露菌病可採用 80%福賽得可濕粉劑 500 倍液防治，其預防效果比較良好。或採用 72%鋅錳克絕混合可濕性粉劑 750 倍液，每隔 7 10 噴一次，3 次。採收前 12 天停止用藥。

七、甘藍植株死亡，原因及防治法？（吳錦坤 花蓮縣吉安鄉福興萬村 4 號）

答：甘藍根部，地際部壞死，係根腐病。建議採用 50%大克爛可濕性粉劑 2,000 倍液，或 50%撲滅寧可濕性粉劑 2,000 倍液，或 50%貝芬同可濕性粉劑 1,000 倍液，每 10 天噴根頭一次。藥液應噴施於根頭地際部，充分潤濕方可收效。安全採收期分別為 7 天、3 天及 6 天。

八、請問馬拉巴栗如何繁殖？（富里鄉竹田村富田路 11 號 林義濬農友）

答：馬拉巴栗通常用種子播種或嫁接也容易成活。播種行株距 20 30 公分×10 15 公分，播後床面覆蓋稻草，澆水以保持土壤濕度，留床半年至一年即可定植。

九、請問可可椰子栽植適期？（玉里鎮高寮 127 號之 6 陳志祥）

答：可可椰子栽植以 4 5 月雨季開始時最適宜。椰苗長至 80 100 公分，苗葉 4 6 片，苗根已露出外果皮，即可定植。