

農友信箱

陳朝欽

一、甜椒葉片上黃色蟲體是何害蟲？如何防治？（張德龍：花蓮縣吉安鄉北昌村自強路五二七巷三三號）

答：經鑑定係棉蚜為害致葉片扭曲，防治方法：(一)生育初期可施較長之藥劑如 50%達馬松溶液 1,200 倍可兼防治薊馬。(二)採集期間施用 3.5%魚藤精乳劑 500 倍液，採收前 4 天停止用藥。

二、柑桔葉片、幼果異狀是何症狀？為何防治？（候文通：花蓮縣壽豐鄉池南村溪南二之一號）

答：經鑑定係潛葉蛾、銹蟬、缺鋅症；防治方法；潛葉蛾：選用 40%免扶克水懸劑 1,200 倍或 40%大福賽寧可濕性粉劑 2,500 倍在新芽萌發時每七天施藥一次。銹蟬選 25%丁基加保扶可濕性粉劑 1,000 倍或 65%鋅乃浦可濕性粉劑 1,000 倍每三週噴佈一次。缺鋅症可施氧化鋅每株 120 150 公克或噴佈鋅乃浦可濕性粉劑 400 倍。

三、鶯歌桃葉片穿孔是何原因造成？（林炳坤：花蓮縣吉安鄉北昌村北昌四街四八號）

答：經鏡檢結果係桃穿孔病引起，初期為黃褐色斑點，後轉褐色斑點，病斑周圍形成離層脫落而呈穿孔狀，可在初發病時每隔七 十天施用 16.5%鏈土黴素可濕性粉稀釋 1,500 倍或 68.8%多保鏈黴素可濕性粉稀釋 1,000 倍，連續五次。

四、洋香瓜下位葉白色條痕及葉有絲狀物是何病蟲？（黃月英：花蓮縣壽豐鄉溪口村牧場一六八號）

答：經診斷係潛蠅及葉蟬為害，尚無正式推薦藥劑，指導施用 2.8%第滅寧乳劑 3000 倍，30 %得氯蟠水懸粉劑 1,500 倍防治，後者先小面積試用，俟無藥害後再大面積施用。

五、胡瓜葉片背面生黴，後乾枯，不知何病害？（吳玉雙：花蓮縣壽豐鄉溪口村溪口一七〇號）

答：經鑑定係胡瓜露菌病，防治方法建議採用 55%晴硫琨銅可濕性粉劑稀釋 500 倍或 58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑 400 倍噴佈。

六、洋香瓜葉片施藥後焦褐是何症狀？（林運發：花蓮縣鳳林鎮林榮里永安里街五二號）

答：經實地診察係施用多種混合藥劑液引起之藥害症狀。藥劑包括有達克靈、錫蟠丹、克露、安收多、加保扶、滅速松，翠綠王等七種並提高濃度施用、（送農藥安全使用手冊、安全期表、植物保護手冊等三種資料借用等依據。）

七、文旦柚天牛應如何防治？

答：(一)在成蟲出現前在樹幹自地面至一公尺高處塗佈石灰乳或包紮塑膠布或塑膠網，以防產卵。(二)或施用 40.64%加保扶水懸劑 100 倍液噴撒施於離地面約 45 公分之樹幹基部，每隔一個月施用一次藥，採收前十天停止施藥。