

## 花蓮區糧食作物病蟲害發生警報

86/9/10 花蓮區農情資訊 92

### ■白葉枯病

一、防治地區及防治適期：各鄉鎮水稻安珀颱風過境後病徵出現應即施藥防治。

二、防治方法：

- 1.避免偏施氮肥；晨露未乾前，勿進入稻田，減少人為傳染菌。
- 2.選用 10% 枯爛可濕性粉劑，每公頃 1.2 公斤 1,000 倍每 10 天施藥一次連續三次。10% 鏈四環素可濕性粉劑每公頃 1 公斤稀釋 1,000 倍發病開始施用每 10 天一次共三次。

三、注意事項：10% 克枯爛可濕性粉劑宜單劑使用，以免發生藥害。

四、發佈依據：水稻受安珀颱風過境大雨影響，普遍發病蔓延，應特別注意防治。

### ■水稻紋枯病

一、防治地區及防治適期：各鄉鎮水稻出現病斑時，應即施藥。

二、防治方法：選用下列一種藥劑施用。

藥 劑	每公頃用量	稀釋倍數
2.94% 待克利乳劑	0.33 公升	3000 倍
25% 寶克隆可濕性粉劑	0.5 公斤	2000 倍
40% 滅普寧水懸劑	0.8 1 公斤	1200 倍
20% 福多寧水懸劑	0.5 公升	2000 倍
16.5% 滅紋乳劑	0.5 公升	2500 倍
6.5% 鐵甲砷酸銨溶劑	0.5 公升	2000 倍
3% 維利徽素溶液	1 1.2 公升	1000 倍

三、注意事項：

- 1.病徵出現時即行施藥，藥劑應噴施發生部位（葉鞘基部），經 14 天後再噴施一次，藥劑噴射全株。
- 2.有機砷劑應依推薦藥劑量、濃度噴施，孕穗後期，抽穗開花期停止施用改用抗生素類藥劑以防藥害。

四、發佈依據：

- 1.水稻已局部初現病斑，田間病原存在，水稻生育至孕穗、抽穗期，株叢間茂密，通氣不良，安珀颱風過境豪雨，濕度增大，容易發病。
- 2.近期氣象，溫度仍高及受東北季風複合影響，降雨頻度機率大，容易發病造成蔓延。

### ■水稻縱捲蟲、稻苞蟲

一、發生地區及防治適期：各鄉鎮水稻。每一平方公尺發現有一隻成蟲或成蟲發生盛期後 7 天，幼蟲捲葉數每叢稻平均達 2 3 葉或幼蟲一隻以上時，即行施藥防除。

二、防治方法：任選下列一種藥劑施用。

藥 劑	每公頃用量	稀釋倍數
50%歐殺松可濕性粉劑	1.2 公斤	1000 倍
11.78%布芬第滅寧乳劑	1 公升	600 倍
40%大福賽寧乳劑	0.48 公升	2500 倍
55%亞素靈溶劑	0.5 公升	2000 倍
22.5 陶斯松乳劑	1.1 公升	750 倍

三、發佈依據：九月上旬田間成蟲出現，其次代幼蟲已於 9 月中、下旬起發生為害。8 月下旬發生稻苞蟲為害稻葉。