花蓮區農作物豪（大）雨後病蟲害發生及防疫因應措施

86/7/10 花蓮區農情資訊 88

本區 6 月份連續降雨，除造成農作物之損害外，各種病蟲害亦有不同程度之發生。為免疫情持續蔓延，影響農作物正常生育，本場特提供下列措施：

作物別	病蟲害別	發生情形	防疫因應措施
水稻	穗稻熱病	各鄉鎮零星至局部、輕度	1.86.06.16 發布發生警訊。 2.推薦雨停歇後即噴施 75%三賽唑 WP、33%鋅錳乃浦 FP、2%保米黴素 S 等藥劑 1　2 次。並應注意安全採收期。
	紋枯病	各鄉鎮局部、輕至中度	1.86.06.16 發布發生警訊。 2.推薦雨停歇後即噴施 3%保粒黴等 S、3%維利黴素 S 等 1　3 次。並應注意安全採收期。
	白葉枯病	各鄉鎮局部、輕至中度	1.86.06.16 發布發生警訊。 2.推薦雨停歇後即噴施 10%克枯爛 WP、10%鏈四環黴素 SD，2　3 次。並應注意安全採收期。
雜糧	落花生葉斑病	各鄉鎮局部、輕至中度	推薦雨停後即噴施 80%鋅錳乃浦 WP1　2 次。並應注意安全採收期。
	玉米煤紋病	各鄉鎮局部、輕至中度	推薦雨停歇後噴施 80%鋅錳乃浦 WP2　3 次。並應注意安全採收期。
葉菜類	浸水腐爛	各鄉鎮蔬菜園區、輕至重度	1.園區徹底排水。撿拾腐葉清理園區。 2.雨停後即予噴施 74.1%銅滅達樂 WP，72%鋅錳克絕 WP 等藥劑 2　3 次預防露菌病，並應注意安全採收期。
瓜果類	露菌病	各鄉鎮、輕至中度	推薦雨停後即予噴施 5%益他安 WP，58%鋅錳滅達樂 WP、12%邁克尼 EC 藥劑 1　3 次，並應注意安全採收期。
	炭疽病	各鄉鎮輕度	推薦雨停後噴施 70%四氯保淨 WP，1　3 次，並應注意安全採收期。
	蔓枯病	各鄉鎮輕度	雨停後噴施 8%貝芬寧 WP，2　3 次，並應注意安全採收期。
	果疫病	各鄉鎮輕度	雨停後噴施 63%銅鋅錳乃浦 WP，1　2 次，並撿除爛腐果，清理園區及注意安全採收期。
	豆煤黴病	各鄉鎮輕度	雨停後噴施 24.9%待克利 EC，2　3 次，並應注意安全採收期。

芋	疫病	吉安普遍 輕至中度	雨停後參考噴施 58%鋅錳滅達樂 WP2　3 次。
	斜紋夜盜蟲	吉安 局部輕度	雨停後即噴施 2.8%畢芬寧 EC、75%硫敵克 WP 等藥劑 1　2 次。
木瓜	根腐病	各鄉鎮 零星輕度	1.注意園區排水，並插立支柱。 2.參考以 25%依得利 EC、35%依得利 WP 稀釋液灌注根際部。
	果疫病	各鄉鎮 零星輕度	1.注意園區排水，及清除病、落果以防螞蟻棲生成為病媒。 2.雨停後噴施 80%鋅錳乃浦 WP、1　2 次，並應注意安全採收期。
柑桔、文旦	潰瘍病	各鄉鎮零星 輕度(葡萄柚應特別注意)	雨停後即噴施 63%銅鋅錳乃浦 WP、65%鎳乃浦 WP，1　2 次。
	潛葉蛾	各鄉鎮雨後注意防治	雨後新萌芽出現受害時噴施 2.8%畢芬寧 EC、大滅松 EC 等藥劑防治。
	銹蜱	各鄉鎮雨後注意防治	雨後轉晴時即應注意蟲口密度，可噴施 50%汰芬隆 WP、25%新殺瑞等藥劑 1　2 次。