

大(豪)雨後農作物管理因應措施

86/6/25 花蓮區農情資訊 87

花蓮地區之氣候自六月初旬起，持續受鋒面及西南氣流影響，時有陣雨或陰雨，至 15 日止累積降雨量已逾 120 公厘，比去(85)年同期降雨量增加 60%，並致使日照時間較去(85)年同期減少 85.4 小時(-73%)，在此種多雨、高濕、寡日照之環境下，影響各類作物之生育與誘引病蟲害發生，為減少受其造成之損害，本場僅就下則主要作物管理上之因應措施，提供農友參考：

■水稻：抽穗後進入乳熟，糊熟或成熟期

- 1.注意田區排水。
- 2.並適時進行穗稻熱病、紋枯病、白葉病之預防施藥。
- 3.早熟品種水稻已屆成熟者，即予收割、乾燥。

■玉米：生育結穗期

- 1.雨後排出園出積水，防止因田土過濕倒伏。
- 2.雨後斜倒之玉米株應扶正，晚植者則予酌施追肥並培土。
- 3.雨後應注意煤紋病、葉斑病之施藥預防。

■落花生：結莢近成熟期

- 1.雨後迅即排水，避免莢果浸水腐爛。
- 2.雨後注意葉斑病之預防施藥。

■蔬菜、瓜果：生育、結果期

- 1.雨後迅即注意園區排水，避免淤淹、腐爛。
- 2.注意氣象大(豪)雨預報，利用覆蓋資材覆蓋畦面，幼株(苗)，並提早採收。
- 3.雨後實施清園，撿拾腐葉、瓜果，並實施葉部，瓜果實各類病害之施藥預防，但應注意遵守安全採收期。
- 4.俟表土乾後實施中耕，並酌培土，補施肥料(每 0.1 公頃硫酸銨 40 公斤、氯化鉀 4 公斤)，以促恢復生育。

■芋：生育中期

- 1.雨後迅即排除園區積水。
- 2.雨後易發生疫病應即時施藥預防，並監視斜紋夜盜蟲之孳生為害，適時施藥。
- 3.俟表土乾後酌施追肥，促恢復生育。

■文旦柚：幼、中果期

- 1.雨後注意園區排水。
- 2.雨後注意潰瘍病、油斑病、藻斑病之預防施藥。

■木瓜：結果期

- 1.雨後注意園區排水。

2.雨後加強疫病、根腐病之預防施藥。