

宜蘭地區注意防治水稻負泥蟲

86/4/10 花蓮區農情資訊 82

宜蘭地區頭城、礁溪、員山、三星、冬山、蘇澳、宜蘭市、壯圍等鄉鎮須注意負泥蟲為害水稻。

凡靠山較潮濕、陰冷地區稻田發生較嚴重，卵產於葉片，排成一至二列，幼蟲與成蟲均嚙食水稻葉肉，使葉片呈現灰白色之縱條，嚴重時全葉變白、枯死、水稻發育受阻，成熟期延長，影響稻穀產量與品質。農友可任選下列一種藥劑防治：

藥劑名稱	每公頃每次用藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及次數	注意事項
3 % 加保扶粉劑	40 60 公斤	-	水稻分蘖期中負泥蟲幼蟲發生時開始噴藥，若施藥後，田間密度尚高，隔 15 天再施藥一次。	限於插秧後 70 天內使用
50 % 益滅松可濕性粉劑	0.8 1.0 公斤	1000		
40.64 % 加保扶水懸粉	1.0 1.2 公斤	800		
90 % 納乃得可濕性粉劑	0.5 0.6 公斤	1800		
50 % 撲滅松乳劑	0.8 1.0 公升	1000		
1 % 安丹粉劑	60 75 公斤	-		
1.5 % 益滅松粉劑	60 公斤	-		
3 % 益滅蝨粉劑	40 公斤	-		
50 % 益滅蝨可濕性粉劑	0.66 公斤	1200		