

注意防治銀葉粉蝨、斜紋夜盜蟲及豆螟

85/09/10 花蓮區農情資訊 68

近來花蓮縣部份地區銀葉粉蝨、斜紋夜盜蟲及田菁豆螟孳生為害，請農友注意防治。

新城鄉順安、新城村與秀林鄉秀林村及吉安鄉太昌、永安、稻香、永興、福興村蔬菜作物園區，應即時施藥防治銀葉粉蝨，以防蔓延，其他鄉鎮亦應注意。易遭銀葉粉蝨為害的作物包括：豇豆（菜豆）、芥菜、絲瓜、辣椒、小胡瓜、番茄、香瓜及鄰近園區低矮灌木；庭園花木、番石榴、楊桃亦可能受其侵害。農友可輪流施用下列任何一種藥劑並共同防治（目前農林廳印頒植物保護手冊對粉蝨尚無推薦防治藥劑，下表所列係參考蔬菜之藥劑種類）。若應用黃色粘板防治，放置時捲成圓筒型，底端與植物體頂端等高，植株間每隔 1 公尺放置一塊，誘捕蟲數占滿或粘性已失，即應更換粘紙。

藥劑名稱	稀釋倍數 (倍)	每公頃每 次施用量 (公升)	注意事項	備註
2.8 % 畢芬寧乳劑	1,000	1.0	採收前 9 天停止施藥	藥液噴布於葉片上、下兩面，每 5 ~ 7 天施藥一次，連續三次。採收完畢或廢耕之豇豆、香瓜園區、散生落花生植株及蔬菜園區鄰近低矮林木、雜草亦應同時施藥。
2.8 % 第滅寧乳劑	1,000	1.0	採收前 6 天停止施藥	
2 % 阿巴丁乳劑	1,000	1.0	採收前 15 天停止施藥。	

吉安鄉各村及其他鄉鎮農田應即時施藥防治斜紋夜盜蟲，尤其是鄰近作物更須特別注意，以防蔓延。斜紋夜盜蟲為害的作物有十字花科蔬菜、瓜類、菠菜、蘆筍、番茄、蔥、馬鈴薯、玉米、高粱、花卉、甘藷、甘蔗、麻、茶……等，幼蟲為雜食性。農友可懸掛誘蟲盆在芋田及鄰近旱作物園區，每 1 公頃 2 個，以性費洛蒙緩釋劑誘殺雄成蟲減少交尾機會，並適時清理盒內蟲體。此外，可任選下列一種藥劑於傍晚時施藥防除，幼蟲體出現時開始施藥，每隔 5 ~ 7 天再施藥一次，田埂、稻稈、雜草堆積處、溝壁亦應同時施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施用量 (公升)	稀釋倍數 (倍)	注意事項
33 % 佈芬百滅寧乳劑	0.8 1.0	1,000	採收前 12 天停止施藥。
30 % 佈飛賽滅寧乳劑	0.8 1.0	1,000	採收前 10 天停止施藥。
35 % 白克松可濕性粉劑	0.25 0.5	3,000	採收前 15 天停止施藥。
2.8 % 畢芬寧乳劑	0.5 1.0	2,000	採收前 9 天停止施藥。
2.8 % 賽洛寧乳劑	0.5 1.0	2,000	採收前 9 天停止施藥。
75 % 硫敵克可濕性粉劑	0.3 0.5	3,000	採收前 6 天停止施藥。

吉安鄉各村及其他鄉鎮種植之田菁應即時施藥防治豆螟（豆莢螟、豆野螟蛾），以防蔓延為害。豆螟為害作物為豆類、田菁等。農友可任選下列一種藥劑施用，於幼齡蟲體出現時噴施一次，之後每隔 5 7 天連續 1 2 次。

藥劑名稱	稀釋倍數（倍）	每公頃每次施藥量
50 % 加保利可濕性粉劑	1,000	1.0-1.2 公斤
85 % 加保利可濕性粉劑	1,700	0.5-0.8 公斤
50 % 撲滅松乳劑	1,000	1.0-1.2 公升
90 % 納乃得可濕性粉劑	2,000	0.5 公斤