

病蟲害警報 注意防治水稻縱捲葉蟲、稻苞蟲及稻心蠅

85/08/10 花蓮區農情資訊 66

由於 7 月中旬起水稻縱捲葉蟲、稻苞蟲及稻心蠅田間成蟲密度漸升高，加上氣候條件適合繁衍為害，玉里鎮、富里鄉早植稻（6 月下旬以前插秧之二期早植稻）應立即防治。每一平方公尺發現有一隻水稻縱捲葉蟲、稻苞蟲成蟲或成蟲發生盛期後 7 天，幼蟲捲葉數每叢稻平均達 2 - 3 葉或幼蟲一隻以上時，即任選下列一種藥劑施用：

藥劑名稱	每公頃每次施用量	稀釋倍數（倍）
50 % 歐殺松可濕性粉劑	1.2 公升	1,000
11.78 % 布芬第滅寧乳劑	1.0 公升	600
40 % 大福賽寧乳劑	0.48 公升	2,500
55 % 亞素靈溶液	0.5 公升	2,000
22.5 % 陶斯松乳劑	1.1 公斤	750

稻心蠅的防治藥劑為：

藥劑名稱	每公頃每次施用量	稀釋倍數（倍）
22.5 % 陶斯松乳劑	1.1 公升	750
40.64 % 加保扶水懸劑	0.7 公升	1,500