

## 花蓮區賀伯颱風過境後主要作物病蟲害發生及防治因應措施

85/08/25 花蓮區農情資訊 67

花蓮縣部分：

作物別	發生病蟲害別	發生地區	發生程度	防治對策
水稻	白葉枯病	玉里、富里	輕	發病初期採 10%克枯爛 10%四環黴素等藥劑防治。每隔 10 天施藥一次，連續 3 次。
文旦柚	無	-	-	-
木瓜	果疫病	新秀地區、吉安、鳳林、光復、瑞穗	輕	1.摘除病果並搬離園區。 2.參考採 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑於發病初期防治，每 7 天一次。
芋	疫病	吉安	輕 - 重	雨後參考採 33%鋅錳乃浦 35%依得利、58%鋅錳滅達樂等藥劑防治，每 7 天施藥一次，連續 2 至 3 次。
茄	果實疫病	花蓮市、吉安	輕	發病初期採 63%銅鋅錳乃浦防治，每 7 天施藥一次。

宜蘭縣部分：

作物別	發生病蟲害別	發生程度	防治對策
文旦	瘡痂病	輕	因颱風過後採 40%快得寧可濕性粉劑 500 倍防治。
青蔥	軟腐病	輕	發生初期，可暫採用 68.8%保鏈黴素可濕性粉劑 1,000 倍防治。
	甜菜夜蛾	輕 - 中	發生初期採 19.7%得芬諾水懸劑 2,000 倍,或 9.6%氟芬隆水分散性乳劑 3,000 倍防治。
十字花科蔬菜	露菌病	輕	採 74.1%銅滅達樂可濕性粉劑 600 倍防治。
	苗立枯病	輕	採 23.2%寶克隆水懸劑 1,000 倍防治。
	小菜蛾、斜紋夜盜	輕	採 2.8%畢芬寧 1,000 倍防治。
	黃條葉蚤	輕	採 50%加保利可濕性 500 倍防治。
	斑潛蠅	輕	採 2%阿巴汀乳劑 2,000 倍防治。
	黑腐病	輕 - 中	採 81.3%嘉賜銅可濕性粉劑 1,000 倍防治。
觀葉植物	疫病	輕	發病初期施用 66.5%普拔克溶液 1,000 倍或 33.5%快得寧水懸劑 1,500 倍或 25%依得利乳劑 1,000 倍，任選一種防治。

	炭疽病	輕	發生初期施用 50% 福多寧可濕性粉劑 3,000 倍防治
--	-----	---	-------------------------------