

病蟲害警報 注意防治葉稻熱病及玉米螟蟲、潛葉金花蟲、煤紋病

85/04/25 花蓮區農情資訊 59

因受近期天氣影響，本場呼籲本區農友注意防治水稻之葉稻熱病及玉米之螟蟲、潛葉金花蟲、煤紋病，防治方法如下：

水稻葉稻熱病

藥劑名稱	每公頃每次施用量 (公斤)	施用方法	注意事項
6 % 撲殺熱粒劑	30	插秧後約 30 天施用	1.施用粒劑時稻田應保持 3 5 公分水位維持 4 5 天。 2.稻葉片發現淡綠色病斑時應即選擇治療藥劑噴施一次，若經 7 天繼續蔓延時再施藥一次。 3.常年發生嚴重地區應在發病前施用預防藥劑。
5 % 百快隆粒劑	40	初發生時施藥	
17 % 丙基喜樂松粒劑	60	插秧後 30 40 天施藥	
50 % 熱必斯可濕性粉劑	1	稀釋 1,200 倍	
75 % 三賽唑可濕性粉劑	0.33	稀釋 3,000 倍	
4 % 保米黴素可濕性粉劑	1	稀釋 1,000 倍	

玉米螟蟲

藥劑名稱	每公頃每次施用量	施用方法	注意事項
45 % 一品松乳劑	1 公升	稀釋 1,000 倍	1.寄生蜂釋放區應按時釋放，並勿噴佈殺蟲劑。必要時可採粒劑施於玉米心部（在雨露乾後施用），以免發生藥害。 2.即時防治至雄花抽出前 15 天。
3 % 加保扶粒劑	40 公斤	施於心葉	
5 % 大福松粒劑	40 公斤	施於心葉	
5 % 陶斯松粒劑	20 公斤	施於心葉	

玉米潛葉金花蟲

藥劑名稱	每公頃每次施用量 (公斤)	施用方法
3 % 加保扶粒劑	40	施於玉米心部
85 % 加保利可濕性粉劑	2	稀釋 800 倍

玉米煤紋病

每公頃每次施用 80 % 錳乃浦可濕性粉 2.5 3.0 公斤，稀釋 400 倍。施藥時應將藥劑噴射於葉片上、下兩面。