改進施肥技術及安全用藥防治瓜園蠅害

85/03/25 花蓮區農情資訊 57

花蓮縣政府為落實執行「防治瓜園蒼蠅管理要點」及輔導正確使用農藥，於各鄉鎮辦理瓜園施肥技術改進及安全用藥座談會。本場應邀將於 3 月 26、27 日晚上 7 時 30 分分別在壽豐鄉、鳳榮地區農會說明瓜園施肥技術改進及安全用藥，請瓜農準時參加。

有關施肥技術及安全用藥注意事項如下：1.將 100 公斤雞糞與 2 公斤氰氮化鈣（俗稱烏肥）充分混合攪拌後，敷蓋塑膠布，堆積 3　5 天經腐熟後再施用於田間，並即覆土（雞糞宜採株間點施後覆土之方式為佳）。2.利用銀黑色塑膠布覆蓋畦面。3.田間之蒼蠅亦可用馬拉松、二氯松、大利松、大滅松等殺蟲劑單獨或混合製成誘餌毒殺之。餌劑可分為乾餌及液體餌。乾餌可用 1　2％之殺蟲劑加誘引劑（如蔗糖與玉米粉或細砂等）均勻混合後撒佈於田間，撒佈時必須戴用橡膠手套，以免發生中毒，亦可裝在小盒內再放置於蒼蠅聚集取食處；液體餌則用 0.1　0.5％之殺蟲劑加 10％蔗糖溶於水中，用噴霧器噴佈或以容器盛裝誘殺之。