

丹參病蟲害防治注意事項 及危害時期

發芽及幼苗期

此時期通常於冷涼季節(10月至隔年2月)，苗期植株幼嫩脆弱，若直播苗株田間有危害苗期之害蟲易有危害折損情形，若以穴盤育苗則可避免害蟲危害，而小型害蟲危害易造成幼株無法正常發育成長。

生育期

生育初期通常為鱗翅目害蟲危害若防治得當，進入生育期之丹參鮮少有病蟲害大發生之情形，部分田區土壤性病害則為全時期該注意之防治對象，而生育期間不免遇上豪雨及颱風，丹參忌淹水，因此隨時保持田區排水暢通，可減少丹參罹病嚴重度。

關鍵病蟲害危害時期

丹參蟲害部分以蚜蟲類害蟲及鱗翅目害蟲為大宗，主要好發於春夏季，病害部分則以根瘤線蟲最為嚴重全期均會發生，褐斑病、疫病及細菌性病害次之，主要集中於春夏季雨多之時期，可參考下列病蟲害發生季節圖。

蟲 害	蚜 蟲											
	鱗翅目害蟲											
月 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
病 害				疫 病								
							細菌性病害					
							褐斑病					
	根瘤線蟲											