

病蟲害警報

注意防治 田菁豆螟、水稻褐飛蟲、水稻螟蟲、粉蟲、斜紋夜盜蟲

84/11/10 花蓮區農情資訊 48

近期內綠肥作物的田菁豆螟大量繁衍，吉安鄉各村種植之田菁應即時施藥防治，以防蔓延為害。其他鄉鎮亦應注意。農友可任選下列一種藥劑施用，於幼齡蟲體出現時噴施一次，之後每隔 5-7 天連續 1-2 次。

藥劑名稱	稀釋倍數 (倍)	每公頃每次施藥量
50 % 加保利可濕性粉劑	1,000	1.0-1.2 公斤
85 % 加保利可濕性粉劑	1,700	0.5-0.8 公斤
50 % 撲滅松乳劑	1,000	1.0-1.2 公升
90 % 納乃得可濕性粉劑	2,000	0.5 公斤

水稻已屆成熟期，氣候持續少雨或微雨，易造成水稻褐飛蟲孳生，富里、玉里地區水稻乳熟期至糊熟期應注意防治。其他鄉鎮亦應注意。防治藥劑任選下列一種：

藥劑名稱	稀釋倍數 (倍)	每公頃每次施藥量	注意事項
20 % 滅必蝨乳劑	800	1.5 公升	1.田間每叢水稻若蟲達 5 隻左右時應即施藥，施藥後蟲口若再升高達 10 隻，再施藥一次 2.藥劑噴布於棲息部位，噴液要充足。
40 % 雙滅必蝨乳劑	800	1.5 公升	
50 % 毆殺松可濕性粉劑	1,000	1.2 公斤	
50 % 滅必蝨可濕性粉劑	1,000	1.2 公斤	
3.5 % 必芬治粉劑		40 公斤	

水稻田間羽化螟蛾出現產卵，其次一世代幼蟲出現為害，造成白穗或枯穗。富里、玉里地區水稻田區，於抽穗前應加以防治，其他鄉鎮亦須注意。農友於抽穗前 5-7 天，可任選下列一種藥劑施用：

藥劑名稱	稀釋倍數 (倍)	每公頃每次施藥量
50 % 撲滅松乳劑	1,000	1.2 公升
50 % 芬殺松乳劑	1,000	1.2 公升
50 % 益滅松可濕性粉劑	1,000	1.2 公升

本場再次提醒農友注意防治粉蟲，尤其新城鄉順安、新城、秀林村及吉安鄉太昌、永安、稻香、永興、福興村須特別注意，蔬菜作物園區應即時施藥防治。防治方法可參考本刊第 45、46 期。此外，吉安鄉各村農田應即時施藥防治斜紋夜盜蟲，尤其是新植芋田及鄰近作物更須特別注意。防治方法可參考本刊第 44、46 期。