

## 病蟲害警報 注意防治粉蝨 以防蔓延為害

84/09/25 花蓮區農情資訊 45

因氣候乾燥少雨，位於新城鄉三棧溪以北的順安、新城、秀林村、蔬菜作物受粉蝨為害，應即時施藥防治，以防蔓延。其他鄉鎮亦應注意防治。

粉蝨繁殖能力強，短時間內即可大量發生。常聚集葉背，吸食汁液，導致葉片焦黃、捲曲、萎縮枯死。若蟲會分泌蜜露而誘發煤病，影響植物光合作用及呼吸作用。農友除應清理各類蔬菜作物園區附近雜草、休耕地及雜木，以減少粉蝨棲息場所外，可施用下列任何一種藥劑共同防治，藥劑參考採用蔬菜可用之種類（目前農林廳印頒植物保護手冊對粉蝨尚無推薦防治藥劑）。

藥劑名稱	稀釋倍數 (倍)	每公頃每次 施藥量(公升)	注意事項	備註
2.8 % 畢芬寧乳劑	2,000	0.5	採收前 9 天停止施藥。	1.藥液噴布於葉片上、下兩面，每 7 10 天施藥一次，連續三次，園區鄰近低矮林木、雜草亦應同時施藥。 2.施藥後應注意安全採收期，施藥時人、畜亦應注意安全。
10 % 百滅寧乳劑	1,000	1.0	採收前 4 天停止施藥。	
2.8 % 第滅寧乳劑	1,000	1.0	採收前 6 天停止施藥。	