

氣候忽冷忽熱 注意水稻稻熱病

花蓮地區水稻生長已進入分蘗期，而最近天氣陰晴不定連日有雨，氣溫溫差大，葉稻熱病極易發生及蔓延，本場籲請農友加強監測並適時作有效防治。

依據過去田間監測資料分析，每年一期作水稻葉稻熱病發生適期為3月下旬至5月上旬，尤以4月上、中旬，即清明節過後發生最嚴重，但今年據氣象局表示有反聖嬰現象呈現暖冬，稻熱病有提早發生跡象。稻熱病的發生與雨水、露水有密切關係，水稻在溫差大的環境

下，會降低抵抗力，更容易感染此病，發病週期僅需4~5天，短時間內爆發疫情。病徵初期於葉面先形成褐色或暗綠色小斑點，再逐漸擴大成紡錘形，此時病斑周圍呈黃色，中間赤褐色，內部灰白色，嚴重時葉片枯萎或全株枯死。

本場建議防治稻熱病應於鋒面南下前後採取適當的措施，防治藥劑使用時應遵守相關規定，不可任意提高或降低濃度，施藥時應均勻噴佈稻葉及穗部，粒劑應均勻撒佈，同時田內保持水深

3~5公分，維持4~5天。

另外田間管理切勿施用過量氮肥，肥料與稻熱病之發生有密切關係，氮肥過多造成植株徒長，葉片柔弱，降低對病害抗性。病害有蔓延傾向時，可多施鉀肥少施氮肥。此外在發病期間也應減少出入稻田，避免稻根受損，影響植株抵抗力。

