

九十八年二月主要作物病蟲害預測

陳任芳

作物別	病蟲害種類	時期	防治要點 (防治藥劑請參考植保手冊)
水稻	水象鼻蟲	全月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 改善耕作環境、清除雜草，整平田面避免積水。 2. 插秧前期秧苗以丁基加保扶、加保扶粒劑處理。 3. 本田期施用培丹、加保扶、丁基加保扶粒劑。
	福壽螺	中下旬	<ol style="list-style-type: none"> 1. 隨時撿拾螺體、摘除銷毀卵塊。 2. 灌溉圳渠進、出水口設置阻隔網(內層粗網6~10目，外層細網16~32目)。 3. 插秧前、後噴撒耐克螺、聚乙醛、苦茶渣等藥劑，期間須保持靜水狀態24小時以上，應注意魚毒。
雜糧、蔬菜	斜紋夜蛾	全月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 田區懸掛性費洛蒙緩釋劑。 2. 針對作物依據植保手冊選擇推薦用藥。初齡幼蟲出現時於傍晚噴施畢芬寧、陶斯松等藥劑。 3. 種植前全園浸水，以殺死土壤中之蛹。 4. 田埂、溝壁亦應同時施藥。
包菜類	菌核病	全月	低溫連續下雨後，選用免克寧、撲滅寧、貝芬同等藥劑噴施。
番茄	晚疫病	全月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以遮雨設施防降雨。 2. 注意氣象預報，低溫連續雨天後或停雨時，即噴施藥劑。 3. 藥劑選用氫氧化銅、亞托敏、賽座滅、達滅芬、凡殺克絕或亞磷酸施用。 4. 參考使用亞磷酸加氫氧化鉀1000倍，病害發生前使用。
韭菜	銹病	全月	選用三得芬乳劑、百克敏乳劑或非克利等藥劑噴施。
十字花科蔬菜	小菜蛾	全月	選用蘇力菌、克凡派水懸劑、因滅汀、脫芬瑞乳劑等藥劑噴施。
	紋白蝶	全月	選用蘇力菌、因滅汀乳劑或傑他賽滅寧乳劑等藥劑噴施。
	蚜蟲類	全月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 清除園區外圍及附近雜草。 2. 選用畢芬寧、益達胺、派滅淨等藥劑噴施。 3. 距作物高度不超過1公尺懸掛黃色粘紙，5公尺置一塊。