## 九十七年十二月主要作物病蟲害預測 作物別 病蟲害種類 時期 防 治 要 點(防治藥劑請參考植保手冊) 蔬菜、雜糧 斜紋夜盜蟲 全月 1. 幼蟲出現時即選用2.8%賽洛寧乳劑等藥劑防治。 2. 田埂、溝壁亦應同時施藥。 3. 設置性費蒙誘殺站,誘殺雌蛾。

等藥劑擇一使用。

1. 清除園區附近雜草。

1. 以遮雨設施防降雨。

蔬菜、瓜果

十字花科蔬菜

番茄

非菜、青蔥

青蔥

銀葉粉蝨

小菜蛾

紋白蝶

蚜蟲類

晚疫病

銹病

疫病

甜菜夜蛾

全月

全月

全月

全月

下旬

全月

全月

上旬

1. 清除園區附近雜草、休耕地、廢耕地殘株及林木等減少棲息場所。

選用蘇力菌、因滅汀乳劑或傑他賽滅寧乳劑等藥劑噴施。

2. 選用達滅芬、亞托敏、氫氧化銅、賽座滅等藥劑噴施。

3. 合理施肥,增加磷鉀肥和微量元素,避免偏施氮肥。 4. 雨季來臨前參考使用亞磷酸1000倍,可誘導防病。 選用三得芬乳劑、百克敏乳劑或菲克利等藥劑噴施。

3. 合理施肥,增加磷鉀肥和微量元素,避免偏施氮肥。

5. 雨季來臨前參考使用亞磷酸1000倍,可誘導防病。

倍、80%福賽得水分散性粒劑500倍等藥劑輪流使用

2. 選用畢芬寧、為達胺、派滅淨等藥劑嘈施。

1. 蔥種種植前先行浸種消毒,陰乾後再種植。

4. 施用草木灰也有利於提高抗病力。

2. 參考選用黑殭菌或核多角體病毒防治。

1.終年懸掛性費洛蒙誘蟲盒。

倍等藥劑。

2. 參考選用畢芬寧、阿巴汀、益達胺等藥劑噴施,並配合懸掛黃色粘板。

2.以10.3蘇力菌水分散性粒劑4000倍、或參考選用黑殭菌或核多角體病毒防治。

2. 選擇種植排水良好地區, 高畦深溝整地, 雨水期可及時排水降低田間濕度。

1. 蟲害發生時以14.5%因得克S.C.2500倍、2.15%因滅汀E.C. 2000倍、5%因滅汀水溶性粒劑5000倍

6. 可參考選擇23%亞托敏水懸劑1000倍、48%松香酯銅乳劑1000倍、75%四氯異苯腈可濕性粉劑700

3. 選用5%因滅汀水溶性粒劑5000倍、19.7%得芬諾水懸劑2000倍、10.3%蘇力菌水分散性粒劑1000

陳任芳