

# 96年6月主要作物病蟲害預測

李豐在

作物別	病蟲害種類	發生時間	防治要點
水稻	穗稻熱病	全月	1.抽穗前5~7天及齊穗期施用75%三賽唑可濕性粉劑或56%保米熱斯混合可濕性粉劑等 2.天候多雨時，施藥時酌加展著劑。
	紋枯病	全月	1.施用賓克隆水懸劑或維利黴素等殘留期較短的藥劑施用。
	白葉枯病	全月	1.注意灌、排水措施。 2.晨露未乾前，避免進入稻田，減少人為傳染。 3.噴施10%克枯爛可濕性粉劑或10%鏈四環素可濕性粉劑稀釋1,000倍。
玉米	螟蛾類	上、中旬	1.雄花抽穗前10~15天，選擇蘇力菌或3%加保扶粒劑施用。 2.雄花抽穗後10天，用50%加保利可濕性粉劑防除。
芋	斜紋夜蛾	全月	1.採用性費洛蒙誘殺雄性成蟲。 2.初齡幼蟲出現時，於傍晚噴施畢芬寧、陶斯松等藥劑。 3.田埂、溝壁亦應同時施藥。
青蔥	甜菜夜蛾	全月	1.採用性費洛蒙誘殺雄性成蟲。 2.選用下列一種藥劑：因得克、因滅汀、畢芬寧、祿芬隆、得芬諾、氟芬隆。
蔬菜瓜果	銀葉粉蝨	全月	1.清除園區附近雜草、林木等減少棲息場所。 2.參考選用畢芬寧、阿巴汀、益達胺等藥劑噴施，並配合懸掛黃色粘板。
果樹類	東方果實蠅	全月	1.全面懸掛果實蠅誘殺板。 2.密度高時以水解蛋白質等食物誘引劑加芬殺松於果園四周噴施誘殺。