

# 籲請稻農防治水稻縱捲葉蟲危害 確保二期水稻品質



▲水稻縱捲葉蟲幼蟲及其危害情形

現在正值水稻第二期作分蘖期，許多鄉鎮發現水稻縱捲葉蟲危害的情形，請農友多加留意，及早防治以降低蟲口密度，確保二期水稻產量及品質。

水稻縱捲葉蟲（瘤野螟）多發生在二期水稻，為臺灣近年來崛起的水稻重要害蟲之一，一齡幼蟲啃食葉片表皮形成微細白色斑痕，二齡幼蟲後會將葉片捲成蟲苞，躲藏其中啃食表皮與葉肉，族群密度高時幾乎所有葉片均會受害，嚴重影響水稻生長和稻穀稔實率。

防治縱捲葉蟲的推薦藥劑甚多，但為維

持藥劑殺蟲效果，可輪流施用不同類型的藥劑，以減緩抗藥性的發生。稻農可任選下列防治藥劑施用：

- 10%得芬諾可濕性粉劑，每公頃每次施用1.2公斤，稀釋1,000倍。
- 19%矽護芬水基乳劑，每公頃每次施用0.6公升，稀釋2,000倍。
- 2.8%賽洛寧乳劑，每公頃每次施用0.5~0.6公升，稀釋2,000倍。
- 50%培丹可溶性粉劑，每公頃每次施用0.8公斤，稀釋1,200倍。
- 有機栽培的水稻可噴施蘇力菌。