

95年4月主要作物病蟲害預測

李豐在

作物別	病蟲害種類	發生時期	防 治 要 點
水 稻	葉稻熱病	全 月	1.氮、磷、鉀三要素肥料均衡施用。2.插秧後25~30天，常年發生地區，施用三賽唑可濕性粉劑或撲殺熱粒劑預防。3.病斑開始出現時，施用熱必斯、護粒丹、鋅錳乃浦、三賽唑等藥劑。
	紋枯病	中、下旬	1.避免偏施氮肥。2.發病時選用賓克隆、待克利、滅紋、鐵甲砷酸銨、維利黴素類藥劑防治。3.施用有機砷劑注意用藥量、稀釋倍數，以防藥害。
	負泥蟲	上、中旬	選用撲滅松、加保扶、益滅松等藥劑噴施。
	螟 蟲	中、下旬	注意初期防除。稻株葉鞘變黃或田間有流葉、折葉、枯心時，即選用撲滅松乳劑等施用。
	水象鼻蟲	全 月	本田期施用免扶克、培丹、加保扶或丁基加保扶粒劑。應注意魚毒。
玉 米	煤紋病	全 月	1.力求肥料三要素平衡使用。2.發病初期施用鋅錳乃浦可濕性粉劑等藥劑防治。
	玉米螟	全 月	1.飼料玉米採用生物防治法釋放寄生蜂或選用依芬寧、加保扶等藥劑防治。2.食用玉米採用釋放寄生蜂，噴施蘇力菌等方式防治。
落花生	葉斑病	中、下旬	病斑出現時即行選用鋅錳乃浦可濕性粉劑等藥劑防治，每10天噴施一次。
	小黃薊馬	全 月	生育初期用達馬松溶液防除，每10~14天噴施一次，共2次。蓮花田可以亞滅培、益達胺等藥劑噴施。
雜糧、蔬菜	夜盜蟲	全 月	1.採用性費洛蒙誘殺成蟲(雄)。2.幼蟲於初發生時選用畢芬寧、陶斯松等藥劑噴施。
韭 菜	銹 病	全 月	選用三得芬乳劑、三得寧乳劑或菲克利等藥劑噴施。
青 蔥	銹 病	全 月	發病初期開始噴施三泰隆藥劑。
蔬菜、瓜果	銀葉粉蝨	全 月	每一葉片逾5隻選用畢芬寧、阿巴汀、益達胺、布芬淨、培丹藥劑，並配合黃色粘紙使用防治。
柑桔類	黑點病、黑星病	全 月	提前預防避免為害果實造成病班。可選用免賴得、晴硫醃、甲基多保淨等藥劑噴施。
	薊 馬	全 月	薊馬發生時，可輪流施用下列藥劑：賽洛寧、丁基加保扶、培丹等藥劑。