

94年

11月主要作物病蟲害預測

李豐在

作物別	病蟲害種類	發生時期	防治要點
水 稻	白葉枯病	上中旬	1.選用10%克枯爛可濕性粉劑、10%鏈四環黴素可溶性粉劑，於發病初期施藥，每隔10天噴藥1次，共3次。2.10%克枯爛可濕性粉劑宜單劑使用，以免發生藥害，可輪流使用不同藥劑減緩抗藥性發生。3.晨露未乾前，勿進入稻田，減少人為傳染。
	胡麻葉枯病	上中旬	水稻齊穗後至黃熟期，施用鋅錳乃浦水懸劑或錳乃浦水懸劑1~2次。
	縱捲葉蟲	上中旬	每平方公尺發現有1隻成蟲或在成蟲發生盛期後7天，幼蟲捲葉數每橫稻平均達3葉或每橫幼蟲1隻以上時選用布芬第滅寧、毆殺松、陶斯松、賽扶寧、賽洛寧、大福賽寧等藥劑防除。
	稻褐飛蝨	上中旬	1.如發現每橫水稻平均在5隻以上成蟲時即應施藥，其後再增加至20隻時行第2次施藥。2.防治時可選益達胺、布芬滅蝨、布芬淨等藥劑噴施。
	紋枯病	上中旬	1.注意田區排水。2.可選用保粒黴素或維利黴素等抗生素藥劑施用。
玉 米	螟 蟲	全 月	1.採用寄生蜂及配合選用加保扶、大福松、陶斯松等粒劑防除(雄花抽穗前)。2.無釋放寄生蜂區可採用蘇力菌、依芬寧等藥劑噴施。
	葉斑病	全 月	1.生育後期營養要素須平衡及充分施用。2.發病初期選用錳乃浦藥劑施於葉片上、下兩面。
雜糧作物	斜紋夜盜蟲	全 月	1.設置性費洛蒙誘殺站誘殺雄蛾。2.幼蟲期配合施用芬化利或硫敵克、百滅寧、賽洛寧、畢芬寧、陶斯松、陶斯寧、蘇力菌、佈飛賽滅寧等藥劑。
蔬菜瓜果	銀葉粉蝨	全 月	1.清除園區附近雜草、休耕地、廢耕地殘株及林木等減少棲息場所。2.參考選用畢芬寧、阿巴汀、益達胺、布芬淨等藥劑噴施，並配合懸掛黃色粘板。