

## 94年 6月主要作物病蟲害預測

楊大吉

作物別	病蟲害種類	發生時期	防 治 要 點
水 稻	穗稻熱病	全月	1.抽穗前5~7天及齊穗期施用75%三賽唑可濕性粉劑或56%保米熱斯混合可濕性粉劑等。 2.天候多雨時，施藥時酌加展著劑。
	紋枯病	全月	施用非有機砷劑或抗生素劑（維利黴素）防治。
	白葉枯病	全月	1.注意灌、排水措施。2.晨露未乾前，避免進入稻田，減少人為傳染。3.發病初期噴施10%克枯爛可濕性粉劑或10%鏈四環素可濕性粉劑稀釋1,000倍，每隔10天施用1次共3次。
	螟蛾類	上、中旬	成蟲出現後7天左右，選用撲滅松、益滅松等藥劑防治。
玉 米	螟蛾類	上、中旬	1.雄花抽穗前10~15天，選擇蘇力菌或3%加保扶粒劑施用。2.雄花抽穗後10天，用50%加保利可濕性粉劑防除。
落花生	小綠浮塵子	全月	發生初期選用50%加保利可濕性粉劑500倍防治。
芋	斜紋夜蛾	全月	1.採用性費洛蒙誘殺雄性成蟲。2.初齡幼蟲出現時，於傍晚噴施畢芬寧、陶斯松等藥劑。3.田埂、溝壁亦應同時施藥。
	疫 病	全月	注意氣象預報，連續雨天或雨停時，即噴施藥劑。選用鋅錳滅達樂、福賽得等藥劑噴施。
青 蔥	甜菜夜蛾	全月	1.全面懸掛性費洛蒙誘殺劑。2.參考使用因得克、因滅汀、祿芬隆、氟芬隆及畢芬寧等藥劑。
蔬菜瓜果	銀葉粉蝨	全月	1.清除園區附近雜草、林木等減少棲息場所。2.參考選用畢芬寧、阿巴汀、益達胺等藥劑噴施，並配合懸掛黃色粘板。
	瓜實蠅	全月	1.全面懸掛克蠅誘殺器誘殺成蟲。2.清除田間被為害、廢棄果。3.參考使用噴施25%馬拉松可濕性粉劑等藥劑。
果 樹 類	東方果實蠅	全月	1.全面懸掛果實蠅誘殺板。2.密度高時以水解蛋白質等食物誘引劑加芬殺松於果園四周噴施誘殺。