

新公告 農藥使用方法與範圍

使用範圍	農藥名稱	使用方法		登記廠商名稱	施藥時期及方法	注意事項
		每公頃每次施藥量	稀釋倍數			
水稻稻熱病	稟稻賜圃 33% 混合可濕性粉劑	稟稻熱病 0.67 公斤 德稻熱病 0.8 公斤	1500	日信農藥股份有限公司	稟稻熱病：發生時開始施藥，19 天後再施藥一次 德稻熱病：抽穗前 7 天及齊穗期各施藥一次	採取前 21 天停止施藥
水稻稻毒螺	聚乙脲 6% 剉劑	5 公斤	—	貝士得隆農企業有限公司	插秧前 1-3 天或插秧當天施用，施藥時加水保持 1-3 公分，約 7 天	施藥當天不排水，以免危害其他水生物
茶黃刺蛾	賜雷殺 11.6% 水懸劑	0.5 公升	2000	台灣道麟股份有限公司	萌芽初期害蟲發生時施藥	採取前 14 天停止施藥
番茄晚疫病	凡殺克絕 52.5% 懸合水分散性粒劑	0.4~0.5 公斤	2500	台灣杜邦股份有限公司	發病初期開始施藥，以後每隔 7 天施藥一次，連續四次	採取前 6 天停止施藥
番茄細菌性斑點病	奎 氣 化 劑 53.8% 水分散性粒劑	0.5~0.6 公斤	2000	台灣杜邦股份有限公司	發病初期開始施藥，以後每隔 7 天施藥一次，連續二次	採取前 6 天停止施藥

(93.04.29 農委會動植物防疫檢疫局字第 0931484244 號)