



## 九十三年六月主要作物病蟲害預測

楊大吉

作物別	病蟲害種類	時    期	防    治    要    點
水    稻	黃稻熱病	全    月	1.抽穗前5-7天及齊穗期施用75%三苯唑可濕性粉劑或56%保米熱斯混合可濕性粉劑等。 2.天候多雨時，施藥時酌加展著劑。
	致枯病	全    月	1.施用非有機砷劑或抗生素劑(維利黴素)防治。
	白葉枯病	全    月	1.注意灌、排水措施。 2.晨露未乾前，避免進入稻田，減少人為傳染。 3.發病初期噴施10%克枯靈可濕性粉劑或10%鏈四環素可濕性粉劑稀釋1,000倍，每隔10天施用一次共三次。
	蠶、蛾、類	上、中旬	成蟲出現後七天左右，選用撲滅松、益滅松等藥劑防治。
玉    米	蠶、蛾、類	上、中旬	1.雄花抽穗前10-15天，選擇蘇力菌或3%加保扶粒劑施用。 2.雄花抽穗後10天，用50%加保利可濕性粉劑防除。
落    花    生	小綠浮塵子	全    月	發生初期選用50%加保利可濕性粉劑500倍防治。
芋	斜紋夜蛾	全    月	1.採用性費洛蒙誘殺雌性成蟲。 2.初齡幼蟲出現時，於傍晚噴施軍芳寧、陶斯松等藥劑。 3.田埂、溝壁亦應同時施藥。
	疫    病	全    月	1.注意氣象預報，連續雨天或雨停時，即噴施藥劑。 2.選用鋅鈷滅達樂、福賽得等藥劑噴施。
蔬菜 瓜果	銀葉粉叢	全    月	1.清除園區附近雜草、枯木等減少棲息場所。 2.參考選用軍芳寧、阿巴汀、益達胺等藥劑噴施，並配合懸掛黃色粘板。
果    樹    類	東方果實蠶	全    月	1.全面懸掛果實蠶誘殺板。 2.密度高時以水解蛋白質等食物誘引劑加芬殺松於果園四周噴施誘殺。