

# 公告核准登記及新增農藥使用方法與範圍

農藥名稱	使用方法		使用範圍	登記廠商名稱	施藥時期及方法	注意事項
	每公頃每次用藥量	稀釋倍數				
陶斯寧50%混合乳劑	1公升	1000	紅豆莢螟	拜耳作物科學股份有限公司	幼蟲發生時期開始施藥，每隔7天施藥一次	採收前6天停止施藥
納乃得40%可溶性粉劑	0.6~0.8公升	1500	甘藍芽蟲類	台灣杜邦股份有限公司	蟲害發生時間開始施藥，每隔7天施藥一次	採收前6天停止施藥
貝他賽扶寧2.9%乳劑	1.0~1.2公升	1500	檬果葉蟬	拜耳作物科學股份有限公司	抽穗及開花蟲害發生時，每隔10天施藥一次	採收前6天停止施藥
合芬寧5%膠囊懸著劑	1.2~1.6公升	500	木瓜葉蟎	惠光化學股份有限公司	葉蟎發生時施藥一次	採收前6天停止施藥
賽座滅9.4%水懸劑	0.3~0.5公升	3000	胡瓜露菌病	台灣石原產業股份有限公司	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續4次	採收前3天停止施藥
			葡萄露菌病			採收前6天停止施藥
克熱淨(烷苯磺酸鹽)40%可濕性粉劑	0.1~1公斤	1500	洋香瓜白粉病	台灣三荳化學工業股份有限公司	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續3次	採收前6天停止施藥
凡殺克絕52.5%混合水分散性粒劑	0.5公斤	2500	馬鈴薯晚疫病	台灣杜邦股份有限公司	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續4次	採收前6天停止施藥
	—		葡萄露菌病			採收前9天停止施藥
	—	1500	蓮霧疫病		發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，直至套袋為止	採收前12天停止施藥
滅普寧75%可濕性粉劑	—	1500(澆灌)	菠菜苗粒枯病	瑞總有限公司	播種後立即澆灌1500倍稀釋液1次，每公尺均勻噴灑稀釋液2公升	限苗床使用

(92.12.03農業委員會農糧字第0920021957號函)