

作物別	病蟲害種類	時 期	防 治 要 點
水 稻	紋 枯 病	全 月	1. 分蘗盛期如發病時，施用有機砷劑或50%福多寧可濕性粉劑等推廣藥劑一次，隔14天再施藥一次。 2. 有機砷劑，易發生藥害，須注意施藥量、濃度及施藥時間。 3. 孕穗、抽穗可選用保粒黴素或維利黴素等抗生素劑施用。
	白 葉 枯 病	全 月	1. 幼穗形成期前施用6%撲殺熱粒劑或於發病初期施用10%克枯爛可濕性粉劑、10%鏈四環黴素可溶性粉劑等。 2. 避免偏用氮肥。晨露未乾前，勿進入稻田，減少人為傳染。
	褐 飛 蝨	下 旬	1. 平均蟲口數每樣在5隻左右時，即應選用必芬治、加護丁滅蝨、毆殺松、滅必蝨等藥劑噴施。 2. 藥劑噴射於稻莖基部，並於若蟲期防治效果較佳。
	螟 蟲	全 月	1. 螟蛾出現後7-10天或葉鞘變黃達10%以上時應即施藥。 2. 選用撲滅松、芬殺松、益滅松、培丹等藥劑防治。
	縱 捲 葉 蟲 稻 苞 蟲	全 月	每平方公尺發現有一隻成蟲或在成蟲發生盛期後七天，幼蟲捲葉數每樣稻平均達三葉(或每樣幼蟲一隻以上時)選用毆殺松、布芬第滅寧、大福賽寧等藥劑防除。
落 花 生	葉 斑 病	全 月	1. 病斑出現即行選用75%四氫異茶時可濕性粉劑或80%錳乃浦可濕性粉劑等施用一次，隔10天再一次，連續四次。 2. 藥劑噴於葉片上、下兩面並酌加展著劑。
	小綠葉蟬 小黃薊馬	下 旬	發生初期選用45%硫敵芬化利可濕性粉劑、50%達馬松溶液施藥一次，經10天再施藥一次，連續施藥1-2次。
	斜 紋 夜 蛾	全 月	1. 設置性費洛蒙誘殺站誘殺雄蛾。 2. 幼蟲期配合施用芬化利、硫敵克、畢芬寧、賽洛寧、白克松等藥劑。
玉 米	玉 米 螟	下 旬	1. 飼料玉米生育初期心葉部被害時用20%依芬寧藥劑防治。 2. 飼料玉米生育中期採用寄生蜂及配合施用加保扶粒劑防除。 3. 食用玉米施用蘇力菌及釋放寄生蜂。
芋	斜 紋 夜 蛾	全 月	1. 採用性費洛蒙緩釋劑誘殺雄性成蟲。 2. 初齡幼蟲出現時，於傍晚噴施畢芬寧或陶斯松等藥劑。 3. 田埂、溝壁亦應同時施藥。
蔬 菜 瓜 果	銀 葉 粉 蝨	全 月	1. 清除園區附近雜草，林木等減少棲息場所。 2. 參考選用畢芬寧、阿巴汀、益達胺等藥劑噴施，並配合懸掛黃色粘板施藥。
果 樹	東 方 果 實 蠅	全 月	1. 全面懸掛含毒甲基丁香油誘殺板。 2. 蛋白質水解物加芬殺松或馬拉松點狀噴施於果園周圍。