

# 洋香瓜進入生育盛期 請農友密切防範病害

洋香瓜為宜蘭縣重要經濟作物，主要栽培於壯圍鄉之新南村、美福村及蘇澳鎮之南澳地區，面積約一百餘公頃。由於品質優良、甜美爽口，頗受消費大眾喜愛，尤其壯圍生產之新世紀哈密瓜更是名聞全國，每年均舉辦哈密瓜節，已是當地產業文化的特色。

目前正值宜蘭洋香瓜生長期間，由於氣候變化劇烈，乍晴乍雨，氣溫變異甚大，致生育初期易引起蔓枯病發生感染，造成洋香瓜之莖蔓及株頭部被害，初呈綠色油浸狀，不久呈膠狀分泌，嚴重時被害處破裂養分及水分無法輸送至莖頂及葉部，至植株萎凋，甚至枯死。洋香瓜於生育中、後期階段，若逢氣候溫暖、低濕、乾燥時，適於白粉病發生感染，初期於葉片呈現白色粉末狀，後變為灰色，葉片變黃枯落，嚴重時葉柄、嫩莖乃至全株均會感染，全園洋香瓜呈現白粉狀而乾枯，影響產量及品質。本場呼籲各位瓜農及早加強防治，以確保洋香瓜之產量品質，其防治藥劑分述如下，供農友參考：

一、蔓枯病防治：可以任選下列為一種藥劑

- (1)50%撲滅寧可濕性粉劑2,000倍，於發病初期施藥一次，以後每隔七天施藥一次，連續四次。
- (2)23%亞托敏水懸劑4,000倍，於發病初期施藥一次，以後每隔七天施藥一次，連續四次。
- (3)50%撲克拉錳可濕性粉劑4,000倍，於發病初期施藥一次，以後每

隔七天施藥一次，連續四次。

- (4)24.9%待克利乳劑3,000倍，於發病初期施藥一次，以後每隔七天施藥一次，連續四次。
- (5)60%得滅寧可濕性粉劑2,000倍，於發病初期施藥一次，以後每隔七天施藥一次，連續四次。
- (6)47%保粒保淨可濕性粉劑1,000倍，於發病初期施藥一次，以後每隔七天施藥一次，連續四次。
- (7)37%護砂保乳劑10,000倍，於發病初期施藥一次，以後每隔七天施藥一次，連續四次。



洋香瓜蔓枯病

二、白粉病防治：可以任選下列一種藥劑

- (1)22.58%快諾芬水懸劑4,000倍，於發病初期施藥一次，以後每隔十天施藥一次，連續三次。
- (2)50%賽普洛水分散性粒劑1,500倍，於發病初期施藥一次，以後每隔十天施藥一次，連續三次。
- (3)25%平克座水分散性粒劑7,500倍，於發病初期施藥一次，以後每隔十天施藥一次，連續三次。

- (4)11.6%四克利水基乳劑1,500倍，於發病初期施藥一次，以後每隔十天施藥一次，連續三次。
- (5)31.25%賽普待克利水分散性粉劑1,000倍，於發病初期施藥一次，以後每隔十天施藥一次，連續三次。
- (6)50%克收欣水分散性粉劑3,000倍，於發病初期施藥一次，以後每隔十天施藥一次，連續三次。
- (7)23.8%待克利乳劑3,000倍，於發病初期施藥一次，以後每隔十天施藥一次，連續三次。
- (8)8%達克利可濕性粉劑3,000倍，於發病初期施藥一次，以後每隔十天施藥一次，連續三次。
- (9)21.2%依滅列乳劑2,000倍，於發病初期施藥一次，以後每隔十天施藥一次，連續三次。
- (10)11.76%分淨賽乳劑10,000倍，於發病初期施藥一次，以後每隔十天施藥一次，連續三次。



洋香瓜白粉病