



# 九十二年六月主要作物病蟲害預測

楊大吉

作物別	病蟲害種類	發生時間	防 治 要 點
水 稻	穗稻熱病	全月	1. 抽穗前 5-7 天及齊穗期施用 75 % 三賽唑可濕性粉劑或 56 % 保米熱斯混合可濕性粉劑等。 2. 天候多雨時，施藥時酌加展著劑。
	紋枯病	全月	1. 施用非有機砷劑或抗生素劑（維利黴素）防治。
	白葉枯病	全月	1. 注意灌、排水措施。 2. 晨露未乾前，避免進入稻田，減少人為傳染。 3. 發病初期噴施 10 % 克枯爛可濕性粉劑或 10 % 鏈四環素可濕性粉劑稀釋 1,000 倍，每隔 10 天施用一次共三次。
	一點螟	上、中旬	成蟲出現後七天左右，選用撲滅松、益滅松等藥劑防治。
玉 米	螟 蟲	上、中旬	1. 雄花抽穗前 10~15 天，選擇蘇力菌或 3 % 加保扶粒劑施用。 2. 雄花抽穗後 10 天，用 50 % 加保利可濕性粉劑防除。
落花生	小綠浮塵子	全月	發生初期選用 50 % 加保利可濕性粉劑 500 倍防治。
芋	斜紋夜盜蟲	全月	1. 採用性費洛蒙誘殺雄性成蟲。 2. 初齡幼出現時，於傍晚噴施畢芬寧、陶斯松等藥劑。 3. 田埂、溝壁亦應同時施藥。
	疫 病	全月	1. 注意氣象預報，連續雨天或雨停時，即噴施藥劑。 選用鋅錳滅達樂、福賽得等藥劑噴施。
蔬菜瓜果	銀葉粉蝨	全月	1. 清除園區附近雜草、林木等減少棲息場所。 2. 參考選用畢芬寧、阿巴汀、益達胺等藥劑噴施，並配合懸掛黃色粘板。