

作物別	病蟲害種類	時 期	防 治 要 點
水稻	葉稻熱病	全月	1. 氮、磷、鉀三要素肥料均衡施用。 2. 插秧後 25-30 天，常年發生地區，施用三賽唑可濕性粉劑或撲殺熱粒劑預防。 3. 病斑開始出現時，施用熱必斯、護粒丹、鋅錳乃浦、三賽唑等藥劑。
	紋枯病	中、下旬	1. 避免偏施氮肥。 2. 發病時選用賓克隆、待克利、滅紋、鐵甲砷酸銨、維利黴素類藥劑防治。 3. 施用有機砷劑注意用藥量、稀釋倍數，以防藥害。
	負泥蟲	上、中旬	選用撲滅松、加保扶、益滅松等藥劑噴施。
	螟 蟲	中、下旬	注意初期防除。稻株葉鞘變黃或田間有流葉、折葉、枯心時，即選用撲滅松乳劑等施用。
	水象鼻蟲	全 月	本田期施用免扶克、培丹、加保扶或丁基加保扶粒劑。應注意魚毒。
玉 米	煤紋病	全月	1. 力求肥料三要素平衡使用。 2. 發病初期施用鋅錳乃浦可濕性粉劑等藥劑防治。
	玉米螟	全月	1. 飼料玉米採用生物防治法釋放寄生蜂或選用依芬寧、加保扶等藥劑防治。 2. 食用玉米採用釋放寄生蜂，噴施蘇力菌等方式防治。
落花生	葉斑病	中、下旬	病斑出現時即行選用鋅錳乃浦可濕性粉劑等藥劑防治，每 10 天噴施一次。
	小黃薊馬	全月	生育初期用達馬松溶液防除，每 10-14 天噴施一次，共 2 次。另外，蓮花田可以亞滅培、益達胺等藥劑噴施。
雜糧、蔬菜	夜盜蟲	全月	1. 採用性費洛蒙誘殺成蟲(雄)。 2. 幼蟲於初發生時選用畢芬寧、陶斯松等藥劑噴施。
蔬菜、瓜果	銀葉粉蝨	全月	每一葉片逾 5 隻選用畢芬寧、阿巴汀、益達胺、布芬淨、培丹藥劑，並配合黃色粘紙使用防治。