

作物別	病蟲害種類	時期	防 治 要 點
 水 稻	白葉枯病	上.中旬	1.選用10%克枯爛可濕性粉劑、10%鏈四環黴素可溶性粉劑，於發病初期施藥，每隔10天噴藥一次，共三次。2.注意：10%克枯爛可濕性粉劑宜單劑使用，以免發生藥害。3.晨露未乾前，勿進入稻田，減少人為傳染。
	胡麻葉枯病	上.中旬	1.水稻齊穗後至黃熟期，施用鋅錳乃浦水懸劑，錳乃浦水懸劑1-2次。
	縱捲葉蟲	上.中旬	每平方公尺發現有一隻成蟲或在成蟲發生盛期後七天，幼蟲捲葉數每叢稻平均達三葉或每叢幼蟲一隻以上時選用布芬第滅寧、毆殺松、陶斯松、賽扶寧、賽洛寧、大福賽寧等藥劑防除。
	稻褐飛蟲	上.中旬	1.如發現每叢水稻平均在5隻以上成蟲時即應施藥，其後再升至20隻時行第二次施藥。2.防治時可選益達胺、布芬滅蟲、布芬淨等藥劑噴施。
	紋枯病	上.中旬	1.注意田區排水。2.可選用保粒黴素或維利黴素等抗生素藥劑施用。
玉 米	螟 蟲	全 月	1.採用寄生蜂生物及配合選用加保扶、大福松、陶斯松等粒劑防除(雄花抽穗前)。2.無釋放寄生蜂區可採用蘇力菌、依芬寧等藥劑噴施。
	葉斑病	全 月	1.力求生育後期營養要素之平衡及充分施用。2.發病初期選用錳乃浦藥劑施於葉片上、下兩面。
雜糧作物	斜紋夜盜蟲	全 月	1.設置性費洛蒙誘殺站誘殺雄蛾。2.幼蟲期配合施用芬化利或硫敵克、百滅寧、賽洛寧、畢芬寧、陶斯松、陶斯寧、蘇力菌、佈飛賽滅寧等藥劑。
蔬菜,瓜果	銀葉粉蝨	全 月	1.清除園區附近雜草、休耕地、廢耕地殘株及林木等減少棲息場所。2.參考選用畢芬寧、阿巴丁、益達胺、布芬淨等藥劑噴施，並配合懸掛黃色粘板。