


作物別	病蟲害種類	時期	防治要點
 水 稻	紋枯病	中、下旬	1. 稻株如出現病斑時，施用有機砷劑或福多寧可濕性粉劑等藥劑一次，隔14天再施藥一次。2. 有機砷劑，易發生藥害，須注意施藥量、濃度及施藥時間（抽穗前10天停止施用）。3. 孕穗、抽穗可選用保粒黴素或維利黴素等抗生素劑施用。
	白葉枯病	上、中旬	1. 選用10%克枯爛可濕性粉劑、10%鏈四環黴素可溶性粉劑，於發病初期施藥，每隔10天噴藥一次，共三次。2. 避免偏用氮肥。晨露未乾前，勿進入稻田，減少人為傳染。
	胡麻葉枯病	全 月	1. 孕穗期及齊穗期施用33%鋅錳乃浦水懸劑，37%錳乃浦水懸劑，25%克利乳劑各一次，2. 抽穗前缺氮時酌施穗肥。
	縱捲葉蟲	全 月	每平方公尺發現有一隻成蟲或在成蟲發生盛期後七天，幼蟲捲葉數每叢稻平均達三葉（或每叢幼蟲一隻以上時）選用毆殺松、布芬第滅寧、陶斯松、賽扶寧、賽洛寧、大福賽寧等藥劑防除。
	螟 蟲	全 月	1. 螟蛾出現後5-7天（尤應注意抽穗前期），選用撲滅松、芬殺松、益滅松等藥劑防治。2. 施用藥量每公頃應至少1,000 - 1,200公升稀釋量。
	褐飛蝨	全 月	1. 如發現每叢水稻平均在5隻以上成蟲時即應施藥，其後再升至20隻時行第二次施藥。2. 防治時可選益達胺、布芬滅蝨、布芬淨等藥劑噴施。
落花生	葉斑病	上 旬	病斑出現即行施用鋅錳乃浦或四氮異苯腈濕性粉劑，隔10天再施用一次，連續四次，藥劑噴於葉片上、下兩面並酌加展著劑。
	銹 病	上 旬	1. 本病初期選用比多農乳劑，亞托敏水懸劑，菲克利水懸劑、四氯異苯腈水懸劑，得克利每10天一次，連續四次。2. 藥劑噴施及葉片上、下兩面，並酌加展著劑。