

山蘇蕨菜注意蝸牛、蛞蝓為害

山蘇蕨菜是東部地區近年來快速發展的新興蔬菜，這種本是原住民傳統食物的原生野蔬，由於嫩芽鮮綠，與丁香魚、豆鼓快炒後質脆爽口，因而日漸受到消費者喜愛，使栽培面積不斷擴增。

山蘇蕨菜的生長極為旺盛，然其性喜陰涼潮濕，在強光下葉片容易黃化使植株生長不良，萌生之新芽品質不佳，因此在從事人工栽培時需搭設遮蔭設施。由於生長環境陰暗多濕，容易誘引蝸牛、蛞蝓或

圓型螺棲息，近來經常發現山蘇蕨菜的幼嫩葉片遭受啃食為害，致產品品質變劣，失去商品價值。

蝸牛、蛞蝓或圓型螺均在夜間出現為害山蘇蕨菜，幼嫩葉片經其啃食後呈不規則圓型洞口，偶而會呈缺割狀，其為害徵狀與斜紋夜盜蟲及毒蛾幼蟲之為害不同，容易區分辨別。

由於蝸牛、蛞蝓或圓型螺性喜陰暗潮濕，農友應改善山蘇蕨菜栽培園區之週邊

環境清潔，避免雜草叢生或廢棄物堆積，儘量減少其棲匿場所。另在山蘇蕨菜栽培園區週邊以6%聚乙醛粒劑，每平方公尺1公克的用量均勻撒施，即可獲至良好的防治效果，並應遵守安全採收期。



山蘇蕨菜遭受蝸牛為害的徵狀