


作物別	病蟲害種類	時期	防治要點
 水 稻	紋枯病	全 月	1.分蘖盛期如發病時，施用有機矽劑或 50% 福多寧可濕性粉劑等推廣藥劑一次，隔 14 天再施藥一次。2.有機矽劑，易發生藥害，須注意施藥量、濃度及施藥時間。3.孕穗、抽穗可選用保粒黴素或維利黴素等抗生素劑施用。
	白葉枯病	全 月	1.幼穗形成期前施用 6% 撲殺熱粒劑或於發病初期施用 10% 克枯爛可濕性粉劑、10% 鏈四環黴素可溶性粉劑等。2.避免偏用氮肥。晨露未乾前，勿進入稻田，減少人為傳染。
	縱捲葉蟲 稻 苞 蟲	中下旬	每平方公尺發現有一隻成蟲或在成蟲發生盛期後七天，幼蟲捲葉數每叢稻平均達三葉 (或每叢幼蟲一隻以上時)選用毆殺松、布芬第滅寧、大福賽寧等藥劑防除。
	褐飛蝨	下 旬	1.平均蟲口數每叢在 5 隻左右時，即應選用必芬治、加護丁滅蝨、毆殺松、滅必蝨等藥劑噴施。2.藥劑噴射於稻莖基部，並於若蟲期防治效果較佳。
	螟 蟲	全 月	1.螟蛾出現後 7-10 天或葉鞘變黃達 10% 以上時應即施藥。2.藥劑選用撲滅松、芬殺松、益滅松、培丹等藥劑防治。
	水象鼻蟲	全 月	1.改善耕作環境、清除雜草，整平田面避免積水。2.本田期施用培丹、加保扶、丁基加保扶粒劑。應注意魚毒。
落花生	葉斑病	全 月	1.病斑出現即行選用 75% 四氣異苯晴可濕性粉劑或 80% 錳乃浦可濕性粉劑等施用一次，隔 10 天再一次，連續四次。2.藥劑噴於葉片上、下兩面並酌加展著劑。
	小綠葉蟬 小黃刺馬	全 月	發生初期選用 45% 硫敵芬化利可濕性粉劑、50% 達馬松溶液施藥一次，經 10 天再施藥一次，連續施藥 1-2 次。
	斜紋夜盜蟲 甜菜夜蛾	全 月	1.設置性費洛蒙誘殺站誘殺雄蛾。2.幼蟲期配合施用芬化利、硫敵克、畢芬寧、賽洛寧、白克松等藥劑。
芋	斜紋夜盜蟲	全 月	1.幼蟲出現時即選用陶斯松、百滅寧、畢芬寧、賽洛寧等藥劑防治。 2.設置性費洛蒙緩誘殺站誘殺雄蛾。
蔬菜,瓜果	銀葉粉蝨	全 月	1.清除園區附近雜草、休耕地、廢耕地殘株及林木等減少棲息場所。 2.參考選用畢芬寧、阿巴丁、益達胺等藥劑噴施，並配合懸掛黃色粘板施藥。