


作物別	病蟲害種類	時期	防 治 要 點
 水 稻	福壽螺	全月	1. 隨時檢拾螺體、卵塊消毀。2. 灌溉水進出口設置阻隔網(內層粗網6-10目, 外層細網16-32目)。3. 插秧前、後施80% 聚乙醛或70% 耐克螺藥劑, 但應注意魚毒。
	螟 蟲	全月	1. 第一期水稻收割後萌生再生稻, 儘速翻犁或焚燒。2. 螟蛾出現後7-10天或有葉鞘變黃時, 施藥防除。3. 秧苗用3% 加保扶粒劑或直播種子用粉衣處理。3. 本田區用50% 撲滅松乳劑等推廣藥劑防治。
	黃萎病	全月	1. 秧田及本田初期, 施用3% 加保扶粒劑或丁基加保扶粒劑防除。2. 秧田及本田附近雜草噴佈藥劑防除黑尾浮塵子。
	縱捲葉蟲 稻 苞 蟲	全月	稻葉出現捲葉率達1% 時, 使用布芬第滅寧、陶斯松、得芬諾等藥劑防治。
	水象鼻蟲	全月	1. 改善耕作環境、清除雜草, 整平田面避免積水。2. 插秧前期秧苗以丁基加保扶、加保扶粒劑處理。3. 本田期施用培丹、加保扶、丁基加保扶粒劑。
玉 米	玉米螟	下旬	1. 飼料玉米生育初期心葉部被害時用20% 依芬寧藥劑防治。2. 飼料玉米生育中期採用寄生蜂及配合施用加保扶粒劑防除。3. 食用玉米施用蘇力菌及釋放寄生蜂。
落花生	薊 馬	下旬	生育初期發生時選用50% 達馬松溶液防除。
	斜紋夜盜蟲	全月	1. 採用性費洛蒙誘殺雄性成蟲。2. 幼株期施用2.8% 畢芬寧乳劑等推廣藥劑, 傍晚噴射根際部。
芋	斜紋夜盜蟲	全月	1. 採用性費洛蒙緩釋劑誘殺雄性成蟲。2. 初齡幼蟲出現時, 於傍晚噴施畢芬寧或陶斯松等藥劑。3. 田埂、溝壁亦應同時施藥。
蔬菜, 瓜果	銀葉粉蝨	全月	1. 清除園區附近雜草, 林木等減少棲息場所。2. 參考選用畢芬寧、阿巴丁、益達安等藥劑噴施, 並配合懸掛黃色粘板施藥。