




作物別	病蟲害種類	時期	防治要點
水稻 	福壽螺	中,下旬	1.隨時撿拾螺體、摘除卵塊。2.灌溉圳渠進、出水口設置阻隔網。3.噴撒耐克螺、聚乙醛、苦茶渣等藥劑,但應注意餘毒。
	黑尾浮塵子	全月	1.水稻收割後,應即翻犁稻田,深埋殘株。2.清除田邊雜草,防範媒介昆蟲潛伏。3.採用加保扶粒劑等於秧苗期或本田初期施用。
	螟蟲	中,下旬	1.水稻收割後儘速翻犁,深埋殘株,減少寄主場所。2.育苗期選用3%加保扶粒劑等施撒。3.成蟲出現後5-7天選用50%撲滅松乳劑等防治。
落花生 玉米	夜盜蟲類	中,下旬	1.採用性費洛蒙誘殺雄性成蟲。2.播種整地時,施撒3%加保扶粒劑或10%福瑞松粒劑等。3.發芽後參考採用2.8%賽洛寧乳劑噴施於根際部,田圍四周同時施藥。
芋	斜紋夜盜蟲	全月	1.採用性費洛蒙緩釋劑誘殺雄性成蟲。2.初齡幼蟲出現時,於傍晚噴施畢芬寧或陶斯松等藥劑。3.田埂、溝壁亦應同時施藥。
	疫病	全月	1.注意氣象預報,連續雨天或停雨時,即噴施藥劑。2.選用鋅錳滅達樂、福賽得等藥劑噴施。
蔬菜,瓜果	銀葉粉蝨	全月	1.清除園區附近雜草,林木等減少棲息場所。2.參考選用畢芬寧、阿巴丁、益達安等藥劑噴施,並配合懸掛黃色粘板施藥。
蓮花	小黃薊馬	全月	1.清除田區附近雜草,避免或減少棲息場所。2.每葉片逾10隻時選用益達胺、芬普尼、亞滅培等藥劑防治。