






作物別	病蟲害種類	時期	防治要點
水稻 	葉稻熱病	全月	病斑開始出現時，施用保米黴素、熱必斯、護粒丹、鋅錳乃浦水懸劑、三賽唑等藥劑。
	穗稻熱病	中,下旬	1.適度施用穗肥。2.抽穗前5-7天施用三賽唑、熱必斯、鋅錳乃浦等藥劑預防，齊穗再施藥一次。
	白葉枯病	全月	1.避免偏施氮肥。2.晨露未乾前，避免進入稻田，減少人為傳染。3.常發病田應於幼穗形成期前施6%撲殺熱粒劑預防。4.病斑初現時以10%克枯爛可濕性粉劑或10%鏈四環黴素可濕性粉劑噴施。
	紋枯病	全月	1.選用寶克隆、待克利、滅紋、鐵甲砷酸銨、貝芬同、維利黴素等藥劑防治。2.使用有機砷劑注意施藥量及倍數，抽穗前10天避免施用，以防藥害。
	螟蟲	中,下旬	1.田間成蟲出現高峰期後7-10天選用撲滅松乳劑等噴施。2.尤須注意孕穗、抽穗前期之施藥防治。
玉米 	煤紋病	全月	注意肥料三要素配合施用；發病初期選用錳乃浦或鋅錳乃浦可濕性粉劑，噴施於葉片上、下兩面。
	銹病	中,下旬	病斑初現時以錳乃浦或鋅錳乃浦可濕性粉劑(參考藥劑)噴施。
	玉米螟	全月	1.生育初、中期釋放寄生蜂，或噴施蘇力菌等防治。2.飼料玉米雄花抽穗前15天選用3%加保扶粒劑等施於心葉部(雨、露水乾後施用以防藥害)。
落花生 	葉斑病	全月	病斑出現時即行選用鋅錳乃浦可濕性粉劑等藥劑防治，每10天噴施一次。
	小黃薊馬	全月	生育初期用達馬松溶液防除，每10-14天噴施一次，共2次。蓮花田以亞滅培、益達胺等藥劑噴施。
雜糧,蔬菜	夜盜蟲	全月	1.採用性費洛蒙誘殺成蟲(雄)。2.幼蟲於初發生時選用畢芬寧、陶斯松等藥劑噴施。